



medway

**PSU MG 2 2021 -
Objetiva - MG**



NOME DO CANDIDATO:

ASSINATURA

SALA:

CARTEIRA:

INSTRUÇÕES

Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES contém 60 questões.

Escreva seu nome completo, sala, carteira e assine no campo indicado.

Utilize caneta de tinta **preta**.

Responda as questões de múltipla escolha no GABARITO.

Não será permitida qualquer espécie de consulta nem o uso de aparelhos eletrônicos.

Leia atentamente as instruções contidas no CADERNO DE RESPOSTAS.

Boa Prova!

**QUESTÃO 1.**

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

ASG, 65 anos, sexo masculino foi internado com quadro de vômitos repetidos devido à obstrução do piloro secundária a úlcera péptica. Quais são, entre as alternativas abaixo, a alteração MAIS PROVAVEL nesse paciente?

- A. Acidose metabólica com ânion gap normal
 - B. Acidose metabólica hipocalêmica
 - C. Alcalose metabólica com ânion gap aumentado
 - D. Alcalose metabólica hipocalêmica
-

QUESTÃO 2.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Paciente do sexo masculino, 55 anos, 70 Kg, sem comorbidades, foi submetido a colectomia videolaparoscópica. O residente da cirurgia geral prescreveu para o pós-operatório imediato 2800 ml de soro glicosado 5% associado a 30 ml de cloreto de sódio 20%. Em relação a soroterapia empregada é CORRETO afirmar:

- A. A oferta de glicose está abaixo das necessidades básicas
 - B. A quantidade de água ofertada está acima do necessário
 - C. A quantidade de sódio ofertada está abaixo das necessidades básicas
 - D. A velocidade de gotejamento deve ser de aproximadamente 40 gotas por minuto para se infundir o total da soroterapia em 24 horas
-

QUESTÃO 3.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Com frequência, na prática clínica, o cirurgião utiliza a associação de adrenalina aos anestésicos locais. Essa associação vai determinar o(a):

- A. Aumento da ligação protéica do anestésico local
 - B. Aumento do pKa do anestésico local
 - C. Redução da concentração plasmática do anestésico local
 - D. Redução da latência anestésica
-

QUESTÃO 4.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

FJT, sexo feminino, de 13 anos de idade, vem apresentando epigastralgia pós-prandial diariamente. Relata que quando ingere frituras apresenta dor em cólica intensa. Mede 1,55m e



pesava 61 kg, mas relata perda de 3kg desde o início dos sintomas dolorosos. Realizou hemograma, provas de função hepática e renal e exame sumário de urina, todos estavam normais. Submetida a ultrassonografia de abdome (ver resultado abaixo). Dentre as alternativas abaixo, qual apresenta a conduta MAIS ADEQUADA para este caso?



- A. Estender a propedêutica com endoscopia digestiva alta
- B. Iniciar tratamento com ácido ursodesoxicólico
- C. Programar cirurgia eletiva
- D. Prescrever medidas dietético-posturais e agendar retorno

QUESTÃO 5.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Na avaliação de paciente na vigência de abdome agudo cirúrgico, geralmente um dos exames solicitados é o hemograma. Dentre suas possíveis alterações, assinale a alternativa que apresenta a correlação CORRETA:

- A. A leucocitose implica necessariamente em processo infeccioso agudo ou crônico
- B. A redução de eosinófilos no sangue geralmente se deve a estresse orgânico
- C. Na hemorragia gastrointestinal aguda há redução concomitante do número de leucócitos (leucopenia)
- D. O hematócrito constitui parâmetro confiável na avaliação da gravidade do sangramento

QUESTÃO 6.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

OLM, sexo feminino, 64 anos de idade, foi submetida a gastrectomia total para tratamento de um adenocarcinoma gástrico. No quinto dia pós-operatório evoluiu com leucocitose e febre de



38,5° C. Assinale a alternativa ERRADA no que se refere à ocorrência de febre e complicações pós-operatórias:

- A. A atelectasia constitui a causa mais comum de febre nas primeiras 48 horas de pós-operatório, sendo mais frequente em pacientes submetidos a anestesia geral e quando realizadas incisões abdominais altas
 - B. A febre da peritonite secundária à fístula geralmente ocorre até o quarto dia pós-operatório, não sendo frequente o aparecimento de alterações sistêmicas, como taquicardia e leucocitose
 - C. A pneumonia pós-operatória acarreta mortalidade elevada, sendo diagnosticada comumente por volta do 4º dia pós-operatório, e sendo uma das principais causas de morte por infecção hospitalar
 - D. O principal mecanismo desencadeador da febre, em resposta aos pirogênios exógenos pode ocorrer por intermédio da produção pelos leucócitos de interleucinas, fator de necrose tumoral e interferon
-

QUESTÃO 7.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Em relação aos tumores malignos da tireoide, analise as afirmativas abaixo e marque como Verdadeiro (V) e Falso (F), e assinale a alternativa CORRETA: 1 - O carcinoma papilífero é o tipo histológico mais comum e geralmente o de melhor prognóstico; 2 - O carcinoma folicular tem pior prognóstico que o papilífero por se tratar de neoplasia indiferenciada; 3 - A tireoglobulina é fundamental no acompanhamento de todos tipos histológicos de tumores malignos da tireoide; 4 - De acordo com a ATA 2015, nódulos tireóideos menores de 1,0cm não devem ser puncionados

- A. F - V - F - V
 - B. V - F - F - F
 - C. V - F - F - V
 - D. F - V - V - V
-

QUESTÃO 8.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R+

Paciente vítima de queda de altura, cerca de 4 metros. À admissão, apresentava-se hipocorado, taquicárdico, queixando dor na bacia, no dorso e no calcâneo (que apresentava deformidade). Ao exame físico, foram observadas instabilidade à palpação da bacia e equimose perineal. Durante a avaliação primária está ERRADO:

- A. Fazer o enfaixamento pélvico, antes de confeccionar a radiografia da bacia
 - B. Manter a estabilização da coluna até que se possa afastar traumatismo raquimedular
 - C. Realizar cateterismo vesical de demora, para monitorizar o débito urinário
 - D. Realizar FAST em busca de causas para o choque hemorrágico
-

**QUESTÃO 9.**

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Homem de 47 anos, após queda de andaime evoluiu com choque hemorrágico secundário a grave lesão hepática. Em relação à fisiopatologia e à resposta ao choque hemorrágico, assinale a alternativa ERRADA:

- A. Na hipotensão, a liberação de noradrenalina e adrenalina ativa os receptores adrenérgicos do miocárdio e da musculatura lisa
 - B. O primeiro mecanismo de compensação em resposta à diminuição do volume intravascular é o aumento da atividade simpática
 - C. Ocorre aumento da frequência e da contratilidade cardíaca, assim como aumento da resistência vascular periférica
 - D. Pela ação das catecolaminas observa-se significativa e paradoxal diminuição da glicose no sangue
-

QUESTÃO 10.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Em relação à cicatrização, assinale a alternativa CORRETA:

- A. A presença de fator de crescimento é essencial à sobrevivência dos fibroblastos
 - B. Deve-se evitar a administração de drogas antiinflamatórias que interferem na ação dos polimorfos nucleares (PMN), essenciais para o processo cicatricial
 - C. Macrófagos e plaquetas são essenciais para angiogênese
 - D. Os glicocorticoides aumentam a produção (síntese) de colágeno
-

QUESTÃO 11.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Em relação aos grandes queimados, assinale a alternativa ERRADA:

- A. Níveis circulantes elevados de catecolaminas, glicocorticoides e glucagon estimulam o catabolismo proteico, a gliconeogênese e a glicogenólise
 - B. O balanço nitrogenado negativo, a resistência à insulina e a lipólise podem persistir por até um ano após lesões graves
 - C. O débito urinário é um bom indicador clínico do status do volume circulante
 - D. O uso de propranolol está formalmente contraindicado no tratamento dos grandes queimados
-

QUESTÃO 12.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1



Em relação à colite pseudomembranosa, assinale a alternativa ERRADA:

- A. Os esporos do microorganismo responsável pela etiologia tem sobrevida efêmera quando fora do organismo humano
 - B. O microorganismo pode ser encontrado em fezes de pacientes assintomáticos
 - C. O teste ELISA para as toxinas A e B nas fezes tem altas sensibilidade e especificidade
 - D. Pode ocorrer translocação das toxinas para a circulação portal
-

QUESTÃO 13.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Em relação ao ciclo menstrual normal, dentre as afirmações abaixo, assinale a alternativa ERRADA.

- A. A regularidade consiste na diferença inferior a 9 dias entre o ciclo mais longo e o ciclo mais curto
 - B. O intervalo é o período medido entre o início da menstruação e o final da mesma
 - C. O período menstrual normal tem duração de até 8 dias
 - D. O volume de sangramento é de caráter subjetivo podendo ser classificado em volumoso, normal ou discreto
-

QUESTÃO 14.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Assinale, das alternativas abaixo, qual NÃO É considerada contraindicação absoluta à terapia de reposição hormonal.

- A. Hepatite grave com alteração de transaminases
 - B. História atual de câncer de endométrio
 - C. História familiar de câncer de mama
 - D. História pessoal de câncer de mama
-

QUESTÃO 15.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Menina, 6 anos, é levada à consulta ginecológica pela mãe com queixa de aparecimento de mamas. Ao exame físico: observado tecido mamário e ausência de pêlos em região de monte pubiano. Sobre o diagnóstico e conduta para esse caso, assinale a alternativa CORRETA.

- A. Não se trata de puberdade precoce, pois o desenvolvimento de pêlos pubianos antecede a telarca
- B. Não se trata de puberdade precoce, uma vez que a telarca antecede a pubarca
- C. Provavelmente trata-se de um caso de telarca precoce e a investigação inicial é feita com o



citologia vaginal a fim de verificar atividade estrogênica.

D. Trata-se de um caso de puberdade precoce e está indicada a terapêutica com análogos do GnRH

QUESTÃO 16.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Mulher, 19 anos, retorna de viagem com queixa de corrimento cujo odor e prurido a estão incomodando. Ao exame físico: apresenta conteúdo vaginal amarelado, pH: 5,5 e teste das aminas positivo. Ao toque não se observa dor à palpação anexial ou de colo uterino. Considerando-se o possível diagnóstico, assinale a alternativa CORRETA.

- A. Entre suas complicações, encontra-se a obstrução tubária
 - B. O exame a fresco demonstrará presença de pseudohifas
 - C. O pH ácido sugere infecção por *Candida* sp
 - D. O uso de tinidazol é uma opção terapêutica
-

QUESTÃO 17.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Mulher, 53 anos, obesa, refere sintomas de urgência miccional que pioraram após a menopausa, sem queixas aos esforços. Ao exame físico: observada atrofia genital, sem distopias. Investigação infecciosa foi negativa. Sobre o quadro, uma opção terapêutica indicada na ABORDAGEM INICIAL é:

- A. Cirurgia de Burch
 - B. Cirurgia de sling
 - C. Fisioterapia
 - D. Terapia hormonal
-

QUESTÃO 18.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Sobre leiomiomas, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). () São tumores que respondem a ação da progesterona e do estrogênio. () Tumores subserosos estão associados a dor pélvica por torção. () Apenas 1% a 3% dos casos de infertilidade estão associados a presença de leiomiomas. () Dor pélvica aguda é a apresentação mais frequente desta condição. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo.

- A. V, F, F, V
- B. V, F, V, F



C. V, V, V, F
D. F, V, V, V

QUESTÃO 19.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Sobre as lesões da vulva, dentre as afirmações abaixo descritas, assinale a alternativa CORRETA.

- A. A vulvosopia é dispensável na suspeita de Líquen escleroatrófico
 - B. O líquen escleroatrófico apresenta risco de malignização
 - C. O líquen escleroatrófico está associado à exposição excessiva ao estrogênio
 - D. O uso de corticoide é a primeira linha de tratamento no caso de líquen plano
-

QUESTÃO 20.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Mulher é admitida com sangramento via vaginal importante e atraso menstrual. Tem tempo de amenorreia de 7 semanas, com teste de gravidez urinário positivo. Ao exame físico: paciente estável, apresentando dor à palpação de baixo ventre, sem dor à descompressão brusca. Especular: observada moderada quantidade de sangue em fundo de saco vaginal e ao toque vaginal; colo fechado. Com base neste caso, assinale a alternativa CORRETA.

- A. A ultrassonografia transvaginal e a dosagem do beta-HCG quantitativo são essenciais ao diagnóstico
 - B. Devido ao quadro de abdome agudo a conduta é videolapascopia
 - C. O diagnóstico é de aborto completo, pois o colo está fechado
 - D. O uso de metotrexate é uma opção terapêutica ao caso
-

QUESTÃO 21.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Mulher, retorna para consulta de pré-natal com curva pressórica demonstrando diversas medidas de 140x90mmHg de pressão arterial. No momento encontra-se com 16 semanas de gestação e apresenta edema de 1 + em membros inferiores. Com base neste caso, assinale a alternativa CORRETA.

- A. Trata-se de uma hipertensão arterial crônica com pré-eclampsia sobreposta devido ao edema progressivo
- B. Trata-se de uma hipertensão arterial gestacional, pois o diagnóstico foi realizado durante a gestação
- C. Trata-se de uma pré-eclampsia, pois a paciente é hipertensa e apresenta edema



D. Trata-se provavelmente de uma hipertensão arterial crônica devido à idade gestacional

QUESTÃO 22.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1


Mulher com 36 semanas de gestação com diagnóstico de síndrome hipertensiva, em uso de metildopa 1 g/dia, comparece para consulta de pré-natal sem queixa e com bom controle pressórico. Ao exame físico, apresenta-se com pressão arterial de 130 x 84 mmHg, edema de 1 +/4+ em membros inferiores e altura uterina de 32 centímetros. Cardiotocografia evidenciou feto ativo. Traz exames laboratoriais: hemoglobina: 13,0 g/dL; plaquetas: 99.000/mcL; creatinina: 0,9 mg/dL; transaminase glutâmico-oxalacética: 32 U/L; transaminase glutâmico-pirúvica: 27 U/L. Com base neste caso, assinale a alternativa que representa a conduta mais CORRETA.

- A. Internação imediata para propedêutica de HELLP síndrome
- B. Retorno semanal até 38 semanas e então agendar resolução devido ao diagnóstico de pré-eclampsia
- C. Retorno semanal até 39 semanas com avaliação semanal de vitalidade fetal e comprometimento sistêmico materno
- D. Retorno semanal até 41 semanas com avaliação semanal de vitalidade letal e comprometimento sistêmico materno

QUESTÃO 23.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Gestante é admitida na maternidade e a condução do seu parto, segue o seguinte partograma. Considerando que o parto ocorreu em 2 horas e 40 minutos, assinale a alternativa que NÃO ESTA ASSOCIADA a este tipo de parto.



- A. Hemorragia puerperal materna
- B. Infecção



- C. Laceração de trajeto de parto materna
 - D. Lesão de plexo braquial no RN
-

QUESTÃO 24.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Mulher, G1 P0, 36 semanas de gestação, usuária de cocaína, chega à maternidade com sangramento vaginal abundante, instável hemodinamicamente. Ao exame físico, observa-se hipertonia uterina, batimento cardíaco fetal de 90bpm e toque vaginal com 2cm de dilatação do colo. Sobre o caso clínico, assinale a alternativa ERRADA.

- A. Deve-se prescrever terbutalina e investigar vitalidade letal com cardiotocografia
 - B. Deve-se proceder a rotura de membrana amniótica imediatamente
 - C. O diagnóstico mais provável é de descolamento prematuro de placenta normoinserida
 - D. Útero de Couvelaire é uma das complicações desta condição
-

QUESTÃO 25.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Em relação às crises epiléticas do tipo Lennox- Gastaut é ERRADO afirmar:

- A. A primeira droga de escolha para o tratamento é a carbamazepina
 - B. As crises epiléticas geralmente são múltiplas e de difícil controle
 - C. É causa de retardo mental
 - D. Geralmente acometem crianças acima de um ano de idade
-

QUESTÃO 26.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Recém-nascido, pré- termo (32 semanas de idade gestacional), desenvolve nas primeiras horas de nascimento, gemência, retrações intercostais, taquipneia, batimentos de aletas nasais, cianose e aumento da necessidade de oxigênio. De acordo com o diagnóstico MAIS PROVÁVEL, é esperado encontrar na radiografia de tórax:

- A. Áreas de atelectasia, com aspecto nodular grosseiro
 - B. Áreas de hiperinsuflação
 - C. Infiltração reticulogranular difusa, homogênea e simétrica
 - D. Pneumotórax
-

QUESTÃO 27.



Qual a afirmativa CORRETA em relação a crise aplástica que pode ocorrer em uma criança com anemia falciforme?

- A. Apesar de a recuperação ser espontânea, a criança deve ser internada, pois não há como prever até que valor a queda da hemoglobina vai atingir
 - B. Geralmente tende a recorrer com frequência
 - C. Geralmente é desencadeado por intercorrência infecciosa bacteriana
 - D. Leucócitos e plaquetas geralmente se encontram diminuídos
-

QUESTÃO 28.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Paulo de 12 meses de idade, previamente saudável, há 4 dias apresenta diarreia , acompanhada de sangue em pequeno volume nas fezes e dor ao evacuar. Está tendo febre não termometrada e hiporexia. Ao exame: alerta, corado, mucosas levemente ressecadas, pulsos cheios, fluxo de extremidades de 2 segundos. Eupneico, abdome flácido à palpação. Dem... aparelhos sem alterações. Alimentação apropriada para a idade. Em relação à conduta quanto à hidratação desta criança está INDICADO:

- A. Aumentar a oferta de líquidos podendo ser água e solução de hidratação oral, após as evacuações
 - B. Infundir solução fisiológica 0,9 %-20ml/kg/ via venosa
 - C. Oferecer solução de hidratação administrada por sonda nasogástrica
 - D. Utilizar terapia de reidratação oral (TRO)
-

QUESTÃO 29.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Paulo de 12 meses de idade, previamente saudável, há 4 dias apresenta diarreia , acompanhada de sangue em pequeno volume nas fezes e dor ao evacuar. Está tendo febre não termometrada e hiporexia. Ao exame: alerta, corado, mucosas levemente ressecadas, pulsos cheios, fluxo de extremidades de 2 segundos. Eupneico, abdome flácido à palpação. Dem... aparelhos sem alterações. Alimentação apropriada para a idade. Em relação ao tratamento e mecanismo de produção da diarreia é CORRETO afirmar:

- A. A droga antimicrobiana de escolha é a sulfametoxazoltrimetopim
 - B. A fórmula láctea deve ser substituída por fórmula semielementar
 - C. É indicado uso de probiótico
 - D. O agente etiológico provável é uma bactéria, invadindo a mucosa do cólon
-

**QUESTÃO 30.**

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Em relação ao tratamento da crise dolorosa vaso-oclusiva grave da anemia falciforme é CORRETO afirmar:

- A. A criança deve ser medicada com morfina para controle das dores
 - B. A oxigenioterapia é sempre indicada
 - C. É contraindicado a hiperidratação venosa
 - D. É indicado transfusão de glóbulos vermelhos
-

QUESTÃO 31.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Em relação ao alojamento conjunto, para os primeiros cuidados com o recém-nascido é ERRADO afirmar:

- A. No alojamento conjunto o recém-nascido deve receber a primeira dose contra hepatite B e a vacina BCG
 - B. O aleitamento ao seio, deve ser em regime de livre demanda
 - C. O ideal é que o recém-nascido permaneça no alojamento conjunto por pelo menos 48 horas, após o nascimento, seja por parto normal ou cesariana
 - D. O recém-nascido deve permanecer ao lado da mãe, em decúbito ventral, em leito individual, de preferência em berço com cuba de acrílico
-

QUESTÃO 32.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Em relação à terapia nutricional de pacientes com colestase crônica, é CORRETO afirmar:

- A. A combinação de má absorção de triglicerídeos de cadeia média e a ingestão inadequada de energia, podem levar a deficiência de ácidos graxos essenciais
 - B. Existe deficiência de absorção de vitaminas lipossolúveis
 - C. Os lipídeos são a principal fonte de calorias
 - D. Os pacientes tem tendência a deficiência de cobre, que deverá ser fornecido pela ingestão de alimentos ricos neste mineral
-

QUESTÃO 33.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Paciente de cinco anos de idade, dá entrada no Pronto Atendimento, em estado de choque séptico, caracterizado por rubor das extremidades, enchimento capilar de 2 segundos, pulsos



cheios, pressão arterial diminuída e baixo débito urinário. Foi iniciado prontamente reposição volêmica com solução fisiológica sem resposta. O próximo passo é INICIAR:

- A. Adrenalina
 - B. Nifedipina
 - C. Noradrenalina
 - D. Vasopressina
-

QUESTÃO 34.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Na sepse, a escolha da antibioticoterapia deve ser direcionada de acordo com a epidemiologia local, o foco da infecção, e o resultado das culturas. Essas informações, geralmente não estão disponíveis no atendimento inicial, devendo a prescrição ser iniciada de forma empírica. Na escolha dos antibióticos é CORRETO afirmar:

- A. No paciente neutropênico febril com suspeita de infecção pelo cateter de longa permanência é indicado a monoterapia com vancomicina
 - B. O tratamento de sepse com antibioticoterapia, deve ter no mínimo 14 dias de duração
 - C. Paciente com infecção adquirida no ambiente hospitalar deve receber associação de cefalosporina de terceira geração e oxacilina
 - D. Sepse sem foco definido, infecção comunitária, paciente previamente hígido, dar preferência à monoterapia com cefalosporina de terceira geração
-

QUESTÃO 35.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Lactente de 2 meses de idade, nascido à termo, apresenta regurgitações frequentes após alimentação. Está sempre irritado e dorme pouco. Já teve pneumonia com 1 mês de idade. Sua cabeça está apresentando uma postura anormal deslocada para a direita e para traz. Não ganhou peso no último mês. O diagnóstico MAIS PROVÁVEL é:

- A. Alergia à proteína do leite de vaca
 - B. Doença do refluxo gastroesofágico
 - C. Doença neurológica
 - D. Imunodeficiência
-

QUESTÃO 36.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Qual das características NÃO se enquadra no Transtorno do Espectro Autista:



- A. Existe um tipo em que são inteligentes, chegando a serem confundidos com gênios
 - B. Há deficiência no domínio da linguagem
 - C. O padrão de comportamento é restritivo e repetitivo
 - D. Os sintomas raramente estão presentes no início da infância
-

QUESTÃO 37.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Os Determinantes Sociais de Saúde (DSS) são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população, tais como moradia, alimentação, escolaridade, renda e emprego. Constitui princípio geral para a implementação de intervenção sobre o DSS:

- A. Centralizar a implementação das ações sobre os DSS no governo federal
 - B. Que se transforme em meta prioritária para o governo e toda a sociedade a distribuição equitativa do bem estar e da saúde
 - C. Ter a coordenação das ações sob a responsabilidade do Ministério Público
 - D. Transformação das ações sobre os determinantes sociais em campanhas
-

QUESTÃO 38.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Com relação à Comunicação de Acidentes de Trabalho - CAT é CORRETO afirmar que:

- A. A CAT deve ser emitida em 6 vias (destinadas ao INSS, empresa, segurado ou dependente, SUS, Ministério do Trabalho e Ministério Público)
 - B. Deve ser emitida apenas para os acidentes que exijam assistência médica e afastamento do trabalho por mais de 24 horas
 - C. Deve ser emitida para todo e qualquer trabalhador em caso de acidente de trabalho
 - D. O envio pela Internet da CAT (CAT eletrônica) facilita o registro de acidentes que não geram benefício acidentário
-

QUESTÃO 39.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Um estudo foi realizado para verificar o efeito do método Pilates (MP) na postura de idosas em uma comunidade. Realizou-se um ensaio clínico em amostra de 40 idosas de idades entre 60 e 80 anos, divididas igualmente em Grupo Pilates (GP) e Grupo Controle (GC). Os grupos responderam questionário sociodemográfico e foram avaliados, em momentos pré e pós-intervenção, utilizando biofotogrametria. O GP executou um protocolo de 12 exercícios do MP, duas vezes por semana, durante 50 minutos, por 12 semanas. Os resultados obtidos mostraram que, na visão anterior, no momento antes da intervenção, a distância entre os



acrômios, epicôndilos e processo estiloide foram menores no GC, em relação ao GP. Verificou-se que após a intervenção não houve diferença significativa entre os grupos. Na visão posterior observou-se diferença estatisticamente significativa nas variáveis: distância do ângulo superior ($p=0,01$) e inferior da escápula ($p=0,02$) do GP em relação ao GC. Concluiu-se que o MP promoveu efeito positivo em algumas variáveis do perfil postural de idosas, podendo ser empregado em grupos de práticas corporais comunitárias. Este ensaio clínico é:

- A. Não randomizado, controlado
 - B. Não randomizado, controlado e aberto
 - C. Randomizado, duplo-cego, placebo-controlado
 - D. Randomizado, não controlado e aberto
-

QUESTÃO 40.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Em uma instituição hospitalar foi realizado estudo no qual foram analisados 202 pacientes submetidos a revascularização miocárdica entre 17 de janeiro e 31 de julho de 2009. Os pacientes foram estratificados em: Grupo G1 -stent, os pacientes que receberam stents; e Grupo G2-operatório de cirurgia de revascularização miocárdica. Um script contendo 62 itens clínicos, hemodinâmicos e cirúrgicos foi usado para a coleta de dados dos prontuários médicos. O estudo concluiu que a revascularização cirúrgica é o melhor procedimento para pacientes com doença coronariana múltipla, especialmente em pacientes diabéticos: permite a revascularização significativamente mais completa, reduz o número de reinternações por causas cardíacas, reduzindo o retorno da angina e melhora a qualidade de vida após cirurgia, com taxas hospitalares e de mortalidade tardia semelhantes aos obtidos por meio de implante de stent. Qual foi o desenho de estudo utilizado?

- A. Ecológico
 - B. Ensaio clínico
 - C. Observacional de coorte
 - D. Transversal
-

QUESTÃO 41.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Paciente de 40 anos de idade, residente em um município com menos de 10.000 habitantes, engravidou do primeiro filho e iniciou o pré-natal na unidade básica de saúde. Na segunda ultrassonografia, foi identificada malformação letal, sendo a gestante encaminhada p... continuidade do pré-natal em serviço de alto risco na capital do estado, onde o parto foi afinal realizado. Quais princípios do SUS foram observados na condução do Caso:

- A. Equidade e integralidade
- B. Regionalização e integralidade
- C. Universalidade e equidade



D. Universalidade e regionalização

QUESTÃO 42.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Um teste diagnóstico com 90% de especificidade e 80% de sensibilidade aplicado a um grupo de mil pessoas resultou em 170 resultados positivos. Isto posto, a prevalência da doença no grupo estudado é:

- A. 1,80%
 - B. 10%
 - C. 21,50%
 - D. 42%
-

QUESTÃO 43.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

A exposição ocupacional a poeiras de sílica pode resultar em uma forma de fibrose intersticial pulmonar conhecida como Silicose. Com relação a esta doença é CORRETO afirmar:

- A. A forma aguda é rara e evolui para cura espontânea em até 5 anos
 - B. A tomografia computadorizada constitui a propedêutica de primeira escolha quando da suspeita de silicose
 - C. Observa-se maior prevalência de tuberculose entre os trabalhadores silicóticos
 - D. Trata-se de uma doença do Grupo II da Classificação de Schilling
-

QUESTÃO 44.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

A Política Nacional de Humanização coloca o acolhimento como diretriz operacional, o que exige uma nova atitude de mudança no fazer em saúde com diversas implicações, sendo uma delas:

- A. A identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco e grau de sofrimento
- B. A presença de um médico no atendimento de porta de entrada da unidade para que o usuário seja classificado de acordo com sua vulnerabilidade à doença
- C. A reorganização do serviço de saúde a partir da problematização dos processos de trabalho sob a liderança e coordenação do médico
- D. O aumento da responsabilização dos profissionais de saúde e elevação dos coeficientes ...



vínculo e confiança

QUESTÃO 45.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Com o objetivo de obter melhores resultados nas ações de promoção da saúde e prevenção das doenças, especialmente das doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes na área de abrangência da unidade básica de saúde, organizou-se um seminário com a equipe de saúde para discutir intervenções adequadas. Leia as assertivas a seguir sobre medidas de intervenção e marque a alternativa ERRADA.

- A. A adoção de medidas para reduzir a exposição a fatores de risco para essas doenças na fase pré-clínica caracteriza a prevenção primária
 - B. A Implementação de programa de rastreamento adequado pode levar ao aumento da prevalência das doenças alvo do programa
 - C. Medidas de prevenção terciária na fase clínica das doenças poderão prevenir complicações e mortes prematuras nas pessoas que já têm as doenças
 - D. Programas de rastreamento são justificáveis se a história natural for alterada pela intervenção
-

QUESTÃO 46.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

A tabela 1 mostra resultados de um estudo de coorte que incluiu homens e mulheres livres de câncer de cólon e reto no início do estudo seguidos por 18 anos. A presença de câncer de cólon e de reto foi identificada com consulta ao sistema de registro de câncer. A prevalência de tabagismo no início do estudo era de 18,2% para homens e 12,4% para mulheres. Tabela 1 - Associação entre tabagismo e risco de câncer de cólon e de reto em homens e mulheres, 1993-2011. Analise a Tabela 1 e assinale a alternativa CORRETA:



Tabela 1 – Associação entre tabagismo e risco de câncer de cólon e de reto em homens e mulheres, 1993-2011.


	Câncer de cólon		Câncer de reto	
	Homens RR (IC95%)*	Mulheres RR (IC95%)*	Homens RR (IC95%)*	Mulheres RR (IC95%)*
Nunca fumou	1.00	1.00	1.00	1.00
Ex-fumante	1.13 (1.02-1.27)	1.12 (1.04-1.30)	1.20 (1.09-1,28)	1.59 (1.29-1.88)
Fumante atual	<u>1.25</u> (1.13-1.39)	<u>1.23</u> (1.11-1.25)	<u>1.60</u> (0.99-1.90)	<u>1.95</u> (1.34-2.42)
RR -risco relativo IC -índice de confiança 95%				
*ajustado por idade, raça/cor de pele, comportamentos relacionados à saúde, índice de massa corporal, história familiar de câncer, história de pólipos no cólon e reto.				

- A. Este tipo de estudo não permite estudar outras doenças relacionadas ao tabagismo
- B. O tabagismo atual foi associado com o risco de desenvolver câncer de cólon e de reto em homens e mulheres, sendo o risco de câncer de reto por tabagismo maior nas mulheres
- C. Os resultados apontam que 25% dos casos de câncer de cólon e 60% dos casos de câncer de reto podem ser atribuídos ao tabagismo atual nos homens; nas mulheres esses percentuais são 23% e 95%, respectivamente
- D. Perdas de seguimento por doenças relacionadas ao tabagismo podem ter atenuado a incidência de câncer de cólon e de reto observada em ambos os sexos, mas com maior impacto nos homens

QUESTÃO 47.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Observe o fluxograma a seguir. O fluxograma 1 apresenta uma estratégia para rastreamento ... sífilis em indivíduos assintomáticos. E CORRETO afirmar que:



Fonte: DDAHV/SVS/MS.

- A. Após realizar os dois testes conforme proposto, a probabilidade de pessoas com o teste treponêmico positivo ter sífilis irá aumentar
- B. Após realizar os dois testes, a capacidade de identificar corretamente aqueles que têm sífi... aumentará
- C. Após realizar os dois testes, a capacidade de identificar corretamente aqueles que não tem sífilis diminuirá
- D. Quanto maior a concordância observada entre o teste não treponêmico e o teste treponêmico, maior será a acurácia da estratégia de rastreamento

QUESTÃO 48.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Estudo desenvolvido para avaliar a associação entre consumo de café e câncer de pâncreas selecionou pacientes com diagnóstico histopatológico de câncer de pâncreas, internados em quatro hospitais e pacientes sem câncer de pâncreas, atendidos pelos mesmos médicos que diagnosticaram as neoplasias, selecionados nos mesmos hospitais e na mesma ocasião. Os resultados estão apresentados na tabela abaixo; Analise os resultados e assinale a alternativa CORRETA:



Consumo de café	Câncer de pâncreas	Sem câncer de pâncreas	TOTAL
Expostos	347	555	902
Não expostos	20	80	100
Total	367	635	1002

$p = 0,0002$. Odds Ratio = 2,5

- A. O café mostrou ter uma associação causal com o Câncer de Pâncreas
- B. O Intervalo de confiança não deve ser considerado uma medida de significância estatística
- C. O valor p encontrado sugere que os pesquisadores devem aceitar a hipótese nula para não cometerem o erro tipo I
- D. Viés de seleção seria introduzido pela inclusão de controles internados por doenças gástricas

QUESTÃO 49.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Mulher de 24 anos inicia tratamento com metimazol 30mg por dia devido a diagnóstico de doença de Graves. São efeitos colaterais raros, porém potencialmente graves, que devem ser clinicamente monitorizados ao longo do tratamento:

- A. Hepatotoxicidade, agranulocitose primária e pancreatite
- B. Hepatotoxicidade, neurotoxicidade e pancreatite
- C. Nefrotoxicidade, agranulocitose primária e neurotoxicidade
- D. Nefrotoxicidade, pancreatite e neurotoxicidade

QUESTÃO 50.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Mulher de 74 anos, sem comorbidades, procura atendimento com quadro de dor torácica em queimação, intensa, de 4 dias de duração, refratária a analgesia com dipirona e anti-inflamatório. A dor se localiza em região dorsal esquerda, na altura da vértebra T10, e se irradia para região anterior do tórax, ipsilateralmente. Ao exame, paciente apresenta no local da dor vesículas de conteúdo claro agrupadas, de base eritematosa, em trajeto que parte da linha medial do dorso até borda esternal esquerda. Diante do quadro clínico, o tratamento MAIS ADEQUADO neste momento é:



- A. Aciclovir e hidrocortisona em creme, tópicos, 3 vezes ao dia por 7 dias
 - B. Aciclovir parenteral 10mg/kg a cada 8 horas, por 7 a 14 dias
 - C. Famciclovir via oral 500mg a cada 8 horas, por 7 dias
 - D. Ganciclovir parenteral 5mg/kg a cada 12 horas, por 14 dias
-

QUESTÃO 51.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Homem de 28 anos, tabagista há 5 anos, atualmente fumando cerca de 1 maço por dia. Procura atendimento pois deseja interromper o hábito. Informa já ter tentado parar de fumar no último ano, mas retornou em poucos dias, em maior intensidade, após perda do emprego e piora de sintomas de ansiedade sem o uso do cigarro. Ainda está desempregado e mantém os sintomas de ansiedade, mas revela-se bastante incomodado com a manutenção do hábito, que vem prejudicando relações sociais e familiares. Para auxiliar o paciente em seu desejo, recomenda-se:

- A. Abordagem comportamental e farmacológica, buscando apoio social, antecipando barreiras e explicando sobre a efetividade do tratamento medicamentoso
 - B. Abordagem comportamental isolada, considerando os poucos anos de tabagismo e o histórico de tentativas prévias
 - C. Abordagem farmacológica isolada, considerando o perfil ansioso do paciente e a baixa probabilidade de adesão a medidas comportamentais
 - D. Orientar o paciente de que este talvez não seja um bom momento de nova tentativa, considerando a manutenção dos fatores causadores de estresse e ansiedade
-

QUESTÃO 52.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Em pacientes com descompensação aguda de insuficiência cardíaca, que se apresentam em pronto atendimento com padrão de congestivo associado a boa perfusão tecidual periférica (perfil quente e úmido), é princípio fundamental de seu tratamento:

- A. Prescrição sistemática e rotineira de vasodilatador parenteral, como nitroglicerina em bomba de infusão, com objetivo de se aliviar pós-carga cardíaca
 - B. Suspensão transitória de suas medicações de uso habitual, especialmente beta-bloqueadores, para se evitar evolução para perfil frio de descompensação
 - C. Utilização de diurético de alça parenteral em dose otimizada, mesmo em pacientes que apresentem piora de função renal à admissão hospitalar
 - D. Utilização de diureticoterapia preferencialmente por via oral, com objetivo de facilitar esquema de prescrição para alta do paciente
-

QUESTÃO 53.



Mulher de 28 anos, tabagista, em uso de anticoncepcional oral combinado, é admitida em sala de emergência em franca insuficiência respiratória. Ao exame apresenta edema de membro inferior esquerdo até raiz de coxa, assimétrico. PA 90/60mmHg; FR 37irpm; FC 135bpm; Sat O₂ em ar ambiente 78%. Ausculta respiratória sem alterações. Eletrocardiograma revela taquicardia sinusal e padrão S1Q3T3 com ondas T negativas em precordiais direitas. O mecanismo fisiopatológico predominante no quadro de insuficiência respiratória de... paciente é:

- A. Efeito espaço morto
 - B. Hipoventilação
 - C. Limitação de difusão
 - D. Shunt verdadeiro
-

QUESTÃO 54.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Sobre o exame físico do abdome, é CORRETO afirmar:

- A. A identificação de macicez à percussão do espaço de Traube é método menos sensível para identificação de esplenomegalia do que a palpação profunda bimanual
 - B. A percussão ao longo da linha hemiclavicular D apresenta maior especificidade para detecção de hepatomegalia do que a palpação profunda do abdome em pneumopatas
 - C. Em casos de abdome doloroso, manobras de palpação e percussão devem ser iniciadas nas áreas de maior sensibilidade, deixando áreas indolores para o final do exame
 - D. O sinal de piparote é mais sensível para detecção de ascite do que o sinal de macicez móvel encontrado à mudança de decúbito do paciente durante a percussão
-

QUESTÃO 55.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Homem de 52 anos, obeso, tabagista, apresenta quadro crônico de pirose, com mais de 5 anos de duração. Já em uso de inibidor de bomba de prótons há longa data. Sem outros sintomas gastrointestinais, sem alteração de hábito evacuatório ou do aspecto das fezes. Percebe ganho de peso não mensurado, no último ano. Sem dados patológicos pregressos ou história familiar relevante. Exame físico sem alterações. Revisão laboratorial com hemograma, funções renal e hepática e perfil lipídico, normais. Marque a alternativa que contém o exame complementar MAIS indicado neste momento, e o MOTIVO de sua indicação:

- A. Endoscopia digestiva alta -> rastreio de esôfago de Barrett
- B. Endoscopia digestiva alta -> rastreio de neoplasia gástrica
- C. Manometria esofageana -> pesquisa de dismotilidade esofageana



D. Radiografia contrastada de esôfago, estômago e duodeno -> pesquisa de esofagite

QUESTÃO 56.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Homem de 62 anos, tabagista 40 anos/maço, obeso, procura atendimento devido a quadro de dispneia progressiva há 3 anos, associada a tosse produtiva com expectoração amarelada mais intensa pela manhã, que clareia ao longo do dia. Atualmente, sente dispneia mesmo para pentear os cabelos. Informa duas passagens na UPA no ano anterior devido a quadro de "gripe forte" e piora importante da dispneia, tendo feito uso de antibioticoterapia nas duas ocasiões. Ao exame, apresenta-se em regular estado geral, FC 90 bpm, FR 25 irpm, PA 120/80 mmHg, Sat O₂ em ar ambiente 90%. Ao exame do aparelho respiratório, apresenta tempo expiratório prolongado com contração de musculatura abdominal, murmúrio vesicular diminuído e crepitações móveis grosseiras protoinspiratórias e expiratórias. Edema de membros inferiores 2+/4+. Fígado de borda romba, amolecido, palpável a 7cm do rebordo costal direito. Qual é o mecanismo de origem dos ruídos adventícios apresentados à ausculta respiratória do paciente?

- A. Abertura e fechamento das vias respiratórias contendo secreção espessa
 - B. Perda da textura do parênquima com consolidação em torno de brônquio pérvio
 - C. Reabertura súbita de bronquíolos previamente ocluídos
 - D. Redução do lúmen de bronquíolos com vibração de suas paredes à passagem do ar
-

QUESTÃO 57.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Homem de 62 anos, tabagista 40 anos/maço, obeso, procura atendimento devido a quadro de dispneia progressiva há 3 anos, associada a tosse produtiva com expectoração amarelada mais intensa pela manhã, que clareia ao longo do dia. Atualmente, sente dispneia mesmo para pentear os cabelos. Informa duas passagens na UPA no ano anterior devido a quadro de gripe forte e piora importante da dispneia, tendo feito uso de antibioticoterapia nas duas ocasiões. Ao exame, apresenta-se em regular estado geral, FC 90 bpm, FR 25 irpm, PA 120/80 mmHg, Sat O₂ em ar ambiente 90%. Ao exame do aparelho respiratório, apresenta tempo expiratório prolongado com contração de musculatura abdominal, murmúrio vesicular diminuído e crepitações móveis grosseiras protoinspiratórias e expiratórias. Edema de membros inferiores 2+/4+. Fígado de borda romba, amolecido, palpável a 7cm do rebordo costal direito. Sobre o arsenal terapêutico disponível para este paciente, é ERRADO afirmar:

- A. O uso de azitromicina a longo prazo possui ação anti-inflamatória e reduz o risco de ocorrência de exacerbações no próximo ano
- B. O uso de corticoide inalatório em associação com terapia broncodilatadora combinada de longa ação melhora função pulmonar e reduz risco de exacerbações
- C. O uso de corticoide sistêmico é benéfico devido ao histórico de infecções respiratórias associadas ao padrão de expectoração apresentado



D. O uso de terapia broncodilatadora combinada de longa ação tem o potencial de melhorar sintomas e a sensação de dispneia do paciente

QUESTÃO 58.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Mulher de 72 anos é levada a consulta pelo marido devido a ""esquecimento frequente"". O quadro se iniciou há 1 ano e vem evoluindo de forma progressiva com esquecimento de eventos recentes e cotidianos, tais como quais foram as refeições feitas no dia. A memória está preservada para fatos de sua juventude. Neste período, tem ficado mais restrita em casa, saindo menos e apresentou um episódio de queda da própria altura. Está parcialmente dependente para atividades instrumentais, e independente para atividades básicas. Sem alterações de humor. Sem dados patológicos pregressos relevantes. Exame físico sem alterações. Mini-exame do estado mental: 17 pontos (em um total de 30 pontos avaliados). Sobre a investigação do quadro acima descrito, é CORRETO afirmar:

- A. Avaliação extensa dos múltiplos domínios cognitivos através de testes psicométricos é essencial para se estabelecer o diagnóstico de demência
 - B. Realização de exame de imagem de sistema nervoso central está contra-indicada, devido à ausência de déficits focais ao exame físico
 - C. Realização rotineira de punção lombar é relevante para excluir causas frequentes de declínio cognitivo como doenças infecciosas, inflamatórias e neoplásicas
 - D. Rotina laboratorial básica com hemograma, função tireoideana e dosagem de vitamina B12 pode indicar causa potencialmente reversível do declínio cognitivo
-

QUESTÃO 59.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Mulher de 64 anos procura atendimento com queixa de dor em joelhos, que aparece ao realizar longas caminhadas e ao subir escadas. Informa também desconforto em articulações das mãos, especialmente das interfalangeanas proximais e distais, que surge quando realiza atividades domésticas como cozinhar e lavar as louças. Quadro de mais de dois anos de duração. Nega outros sintomas. Histórico de hepatite C tratada no último ano. Os dados relevantes ao exame físico são: IMC 32 kg/m², presença de nódulos de Heberden e Bouchard em mãos bilateralmente, redução da amplitude de flexão dos joelhos, com crepitações à mobilização de ambos. Paciente traz exames realizados na atenção primária: hemoglobina 13,6 g/dl, global de leucócitos 6.700/pL, plaquetas 170.000/pL, proteína C reativa 5 mg/dl (VR < 5mg/dl), VHS 10 mm (VR < 20mm), fator reumatoide 38 UI/ml (VR < 14 UI/ml). Qual o diagnóstico mais plausível para o quadro, dentre as alternativas colocadas abaixo:

- A. Artrite reumatoide
- B. Fibromialgia
- C. Gota



D. Osteoartrite

QUESTÃO 60.

PSU MG 2 2021 - Objetiva - MG | R1

Mulher de 64 anos procura atendimento com queixa de dor em joelhos, que aparece ao realizar longas caminhadas e ao subir escadas. Informa também desconforto em articulações das mãos, especialmente das interfalangeanas proximais e distais, que surge quando realiza atividades domésticas como cozinhar e lavar as louças. Quadro de mais de dois anos de duração. Nega outros sintomas. Histórico de hepatite C tratada no último ano. Os dados relevantes ao exame físico são: IMC 32 kg/m², presença de nódulos de Heberden e Bouchard em mãos bilateralmente, redução da amplitude de flexão dos joelhos, com crepitações à mobilização de ambos. Paciente traz exames realizados na atenção primária: hemoglobina 13,6 g/dl, global de leucócitos 6.700/pL, plaquetas 170.000/pL, proteína C reativa 5 mg/dl (VR < 5mg/dl), VHS 10 mm (VR < 20mm), fator reumatoide 38 UI/ml (VR < 14 UI/ml). Considerando a hipótese diagnóstica mais provável, indique a alternativa que contenha o tratamento farmacológico MAIS ADEQUADO para a paciente:

- A. Antidepressivo tricíclico em dose baixa ao se deitar
- B. Antiinflamatório não esteroideal tópico nas articulações acometidas
- C. Droga antirreumática modificadora de doença, como metotrexato
- D. Droga hipouricemiante, como alopurinol, em dose única diária



GABARITO

1. (A) (B) (C) (D)

2. (A) (B) (C) (D)

3. (A) (B) (C) (D)

4. (A) (B) (C) (D)

5. (A) (B) (C) (D)

6. (A) (B) (C) (D)

7. (A) (B) (C) (D)

8. (A) (B) (C) (D)

9. (A) (B) (C) (D)

10. (A) (B) (C) (D)

11. (A) (B) (C) (D)

12. (A) (B) (C) (D)

13. (A) (B) (C) (D)

14. (A) (B) (C) (D)

15. (A) (B) (C) (D)

16. (A) (B) (C) (D)

17. (A) (B) (C) (D)

18. (A) (B) (C) (D)

19. (A) (B) (C) (D)

20. (A) (B) (C) (D)

21. (A) (B) (C) (D)

22. (A) (B) (C) (D)

23. (A) (B) (C) (D)

24. (A) (B) (C) (D)

25. (A) (B) (C) (D)

26. (A) (B) (C) (D)

27. (A) (B) (C) (D)

28. (A) (B) (C) (D)

29. (A) (B) (C) (D)

30. (A) (B) (C) (D)

31. (A) (B) (C) (D)

32. (A) (B) (C) (D)

33. (A) (B) (C) (D)

34. (A) (B) (C) (D)

35. (A) (B) (C) (D)

36. (A) (B) (C) (D)

37. (A) (B) (C) (D)

38. (A) (B) (C) (D)

39. (A) (B) (C) (D)

40. (A) (B) (C) (D)

41. (A) (B) (C) (D)

42. (A) (B) (C) (D)

43. (A) (B) (C) (D)

44. (A) (B) (C) (D)

45. (A) (B) (C) (D)

46. (A) (B) (C) (D)

47. (A) (B) (C) (D)

48. (A) (B) (C) (D)

49. (A) (B) (C) (D)

50. (A) (B) (C) (D)

51. (A) (B) (C) (D)

52. (A) (B) (C) (D)

53. (A) (B) (C) (D)

54. (A) (B) (C) (D)

55. (A) (B) (C) (D)

56. (A) (B) (C) (D)

57. (A) (B) (C) (D)

58. (A) (B) (C) (D)

59. (A) (B) (C) (D)

60. (A) (B) (C) (D)



RESPOSTAS

01.	D	21.	D	41.	ANULADA
02.	D	22.	A	42.	B
03.	C	23.	B	43.	C
04.	C	24.	A	44.	ANULADA
05.	B	25.	A	45.	A
06.	B	26.	C	46.	D
07.	C	27.	A	47.	A
08.	C	28.	A	48.	D
09.	D	29.	D	49.	A
10.	C	30.	A	50.	C
11.	D	31.	D	51.	A
12.	ANULADA	32.	B	52.	C
13.	B	33.	C	53.	A
14.	C	34.	D	54.	B
15.	C	35.	B	55.	A
16.	D	36.	D	56.	A
17.	D	37.	B	57.	C
18.	B	38.	D	58.	D
19.	ANULADA	39.	A	59.	D
20.	A	40.	C	60.	B