



medway

**AMP - PR-2026-Objetiva
- PR**



NOME DO CANDIDATO:

ASSINATURA

SALA:

CARTEIRA:

INSTRUÇÕES

Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES contém 50 questões.

Escreva seu nome completo, sala, carteira e assine no campo indicado.

Utilize caneta de tinta **preta**.

Responda as questões de múltipla escolha no GABARITO.

Não será permitida qualquer espécie de consulta nem o uso de aparelhos eletrônicos.

Leia atentamente as instruções contidas no CADERNO DE RESPOSTAS.

Boa Prova!



QUESTÃO 1.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Menina de 4 anos apresenta há três dias conjuntivite unilateral à esquerda, com edema e hiperemia, mas indolor e sem secreção. Também apresenta linfadenopatia pré-auricular ipsilateral. Nega febre ou sintomas respiratórios. Não fez viagem recente, tem gato e cachorro em casa; nega casos semelhantes na família. Qual o diagnóstico mais provável?

- A. Glaucoma.
 - B. Conjuntivite por adenovírus.
 - C. Conjuntivite por Epstein-Barr.
 - D. Ceratoconjuntivite por esporotricose.
 - E. Síndrome oculoglandular de Parinaud.
-

QUESTÃO 2.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

A hérnia diafragmática congênita é a protrusão do conteúdo abdominal para dentro do tórax através de anomalia do diafragma. Sobre isso analise as afirmativas abaixo. I-Em 90% dos casos ocorre na porção posterolateral do diafragma, chamada de hérnia de Bochdalek, sendo a maioria do lado esquerdo. II - As hérnias anteriores são chamadas de H. de Morgagni e são bem menos comuns. III - A principal causa de morbimortalidade é a hipoplasia pulmonar. Assinale a alternativa correta.

- A. As afirmativas I e II estão corretas, a III está incorreta.
 - B. As afirmativas I e III estão corretas, a II está incorreta.
 - C. As afirmativas II e III estão corretas, a I está incorreta.
 - D. As afirmativas I, II e III estão corretas.
 - E. As afirmativas I, II e III estão incorretas.
-

QUESTÃO 3.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

A indicação de albumina humana no edema nefrótico grave deve ser individualizada, não sendo possível recomendar o seu uso sistemático. I – A infusão de albumina em pacientes hipervolêmicos deve ser feita com cautela. PORQUE II - Pode exacerbar a volemia, causando insuficiência cardíaca edema pulmonar e piora da hipertensão arterial, sobretudo quando em infusão rápida.

- A. Ambas afirmativas estão corretas e a II é uma justificativa correta da I.
- B. Ambas afirmativas estão corretas e a II não é uma justificativa correta da I.
- C. A afirmativa I está correta e a II incorreta.
- D. A afirmativa I está incorreta e a II correta.



E. Ambas estão incorretas.

QUESTÃO 4.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Sobre a intussuscepção intestinal na infância, analise as afirmativas abaixo I - A forma mais comum é a íleo-cólica. II - O ultrassom é o padrão ouro para diagnóstico. III - O ápice da intussuscepção pode se exteriorizar pelo ânus, em casos negligenciados. Assinale a alternativa correta.

- A. As afirmativas I e II estão corretas, a III está incorreta.
 - B. As afirmativas I e III estão corretas, a II está incorreta.
 - C. As afirmativas II e III estão corretas, a I está incorreta.
 - D. As afirmativas I, II e III estão corretas.
 - E. As afirmativas I, II e III estão incorretas.
-

QUESTÃO 5.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

A cetoacidose diabética (CAD) é uma complicação aguda que ocorre tipicamente no diabetes tipo 1. Sobre esta situação assinale a alternativa correta.

- A. O bicarbonato de sódio pode ser utilizado nas CAD graves com $\text{pH} < 7,0$.
 - B. A avaliação dos níveis de potássio sempre deve ser feita antes da insulinização.
 - C. A administração da insulina EV pode ser suspensa imediatamente ao se aplicar a primeira dose SC.
 - D. A gravidade da CAD pode ser classificada em leve, moderada ou grave, sendo baseada na glicemia.
 - E. O edema cerebral, complicação mais temida da CAD, deve ser tratado com furosemida e dexametasona.
-

QUESTÃO 6.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Na avaliação de uma criança com baixa estatura o principal indicador de uma baixa estatura patológica é a velocidade de crescimento baixa. I- Em caso de baixa estatura com baixa velocidade de crescimento o principal exame a colher é a dosagem de GH. PORQUE II - A principal causa endocrinológica de baixa estatura é a deficiência de GH.

- A. Ambas afirmativas estão corretas e a II é uma justificativa correta da I.
- B. Ambas afirmativas estão corretas e a II não é uma justificativa correta da I.
- C. A afirmativa I está correta e a II incorreta.



- D. A afirmativa II está incorreta e a I correta.
E. Ambas estão incorretas.
-

QUESTÃO 7.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Paciente de dois anos vem a consulta por estar apresentando espasmos de membros, com piora recente. Tem antecedentes de rabdomioma cardíaco ao nascimento e recentemente perda de algumas habilidades. Ao exame lesões cutâneas hipocrômicas em formato de folha. Qual o diagnóstico mais provável?

- A. Neurofibromatose.
B. Nevo hipocrômico.
C. Esclerose tuberosa.
D. Hanseníase sistêmica.
E. Síndrome de Lennox-Gastaut.
-

QUESTÃO 8.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

A comunicação interatrial (CIA) é a cardiopatia congênita mais comum e geralmente os pacientes são assintomáticos ou oligossintomáticos. Na maioria dos pacientes com CIA o achado característico na ausculta é

- A. segunda bulha única e alta.
B. sopro sistólico de regurgitação.
C. desdobramento amplo e fixo da segunda bulha.
D. sopro sistólico de ejeção em borda esternal es-querda.
E. estalido protossistólico com segunda bulha hipofonética.
-

QUESTÃO 9.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Nas crianças a apendicite aguda tem uma apresentação clínica muito variada e menos de 50% dos casos têm uma apresentação clássica. Na avaliação de uma criança com suspeita de apendicite aguda, analise as afirmativas abaixo. I-A dor abdominal localizada é o achado diagnóstico mais confiável no diagnóstico de apendicite aguda. II - O uso criterioso da analgesia com morfina para aliviar a dor abdominal não altera a precisão diagnóstica. III - Nos casos de apêndice localizado inteiramente na pelve a dor pode ser mínima no exame abdominal.



- A. As afirmativas I e II estão corretas, a III está incorreta.
 - B. As afirmativas I e III estão corretas, a II está incorreta.
 - C. As afirmativas II e III estão corretas, a I está incorreta.
 - D. As afirmativas I, II e III estão corretas.
 - E. As afirmativas I, II e III estão incorretas.
-

QUESTÃO 10.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

A bronquiolite viral aguda é caracterizada por inflamação aguda, edema necrose de células epiteliais das pequenas vias aéreas, promovendo impactação de muco intraluminal. Sobre esta situação assinale a alternativa correta.

- A. A infecção pelo vírus sincicial respiratório confere imunidade duradoura.
 - B. A presença de febre elevada é um achado comum na fase pulmonar da doença.
 - C. É fundamental a realização de imagem radiográfica e de exames laboratoriais para o correto diagnóstico.
 - D. As técnicas de fisioterapia respiratória possuem elevada efetividade no manuseio dos pacientes portadores da doença.
 - E. A administração de oxigênio por cânula nasal de alto fluxo parece estar associada à menor possibilidade de necessitar de suporte ventilatório invasivo.
-

QUESTÃO 11.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Paciente do sexo masculino, de 11 anos, chegou à emergência hospitalar levado por familiares com queimadura por explosão de gasolina há 3 horas. O paciente chegou agitado, apresentando dificuldade respiratória e estridor, saturando a 90% em ar ambiente. No primeiro atendimento foram retiradas as roupas do adolescente, puncionado o acesso venoso, analgesia com opioide e estimada a superfície corporal queimada (SCQ), por meio da fórmula de Lund-Browder, em 44% (queimadura em face, tronco e abdome anterior, períneo e coxas). Assinale a alternativa que apresenta as próximas condutas nesse caso.

- A. Proceder à intubação e iniciar a ressuscitação pela fórmula de Parkland.
 - B. Realizar uma broncoscopia para identificar e diagnosticar a lesão inalatória.
 - C. Iniciar a ressuscitação pela fórmula de Parkland e passar uma sonda vesical de demora.
 - D. Passar uma sonda vesical e mensurar a diurese para decidir qual é a necessidade de ressuscitação.
 - E. Ofertar oxigênio por máscara não reinalante, realizar expansão com soro fisiológico 0,9% e iniciar antibioticoterapia.
-

QUESTÃO 12.



Na admissão hospitalar de uma criança com déficit motor súbito, afasia e flutuação do nível de consciência a conduta mais adequada após estabilização clínica seria

- A. realizar uma dose de heparina de baixo peso molecular.
 - B. administrar dose de ácido acetilsalicílico de 5mg/kg e encaminhar o paciente para internamento.
 - C. realizar tomografia computadorizada de crânio para descartar acidente vascular cerebral hemorrágico.
 - D. solicitar internamento imediato, obter dois acessos periféricos calibrosos e manter o paciente em leito de enfermaria com monitoração.
 - E. realizar hidratação venosa com soro fisiológico 20mL/kg, encaminhar o paciente para neurocirurgia e implementar medida de pressão intracraniana.
-

QUESTÃO 13.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Em qual etapa do desenvolvimento um bebê apresenta-se mais sereno, pacífico, sem cólicas, sorrindo com mais frequência, iniciando um interesse maior pelo rosto humano, fixando mais o olhar, postura simétrica, mãos abertas, reflexa plantar já praticamente ausente e o reflexo de Moro começa a desaparecer?

- A. 0 a 2 meses.
 - B. 2 a 4 meses.
 - C. 4 a 6 meses.
 - D. 6 a 9 meses.
 - E. 9 a 12 meses.
-

QUESTÃO 14.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

No atendimento de um trauma que levou à morte de uma criança ou adolescente, ou no caso em que a vítima chegou morta ao serviço de saúde I-é vedado ao médico oferecer Atestado de Óbito em qualquer situação de morte por causa violenta ou suspeita, seja por acidente ou violência EXCETO II – se não houver Instituto Médico Legal no município e região do falecimento, sem necessidade de comunicação à autoridade local.

- A. Ambas afirmativas estão corretas e a II é uma justificativa correta da I.
 - B. Ambas afirmativas estão corretas e a II não é uma justificativa correta da I.
 - C. A afirmativa I está correta e a II incorreta.
 - D. A afirmativa II está incorreta e a I correta.
 - E. Ambas estão incorretas.
-

**QUESTÃO 15.**

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Na faixa etária pediátrica, sobretudo antes dos seis anos de idade, as intoxicações não intencionais são frequentes, em virtude da curiosidade da criança em explorar o ambiente. Sobre as intoxicações nesta faixa etária, assinale a alternativa correta.

- A. O uso do carvão ativado melhora o prognóstico destes pacientes.
 - B. A lavagem gástrica está indicada de rotina, especialmente dentro das duas primeiras horas da ingestão.
 - C. A naloxona é o antídoto de escolha para as intoxicações por benzodiazepínicos e opioides.
 - D. A descontaminação cutânea é indispensável nas intoxicações por organofosforados com exposição cutânea.
 - E. A alcalinização da urina tem por objetivo alterar o pH para dificultar a passagem do tóxico através das membranas biológicas e deve ser feita em bôlus dentro da primeira hora do atendimento.
-

QUESTÃO 16.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

É consenso que a amamentação é a melhor forma de alimentar a criança no início da vida e é inigualável. A OMS, o Ministério da Saúde do Brasil e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam o aleitamento materno (AM) de forma exclusiva nos primeiros seis meses. Assinale a alternativa correta sobre o AM.

- A. O tempo de permanência na mama em cada mamada deve ser pré-estabelecido.
 - B. Após os dois anos o AM deve ser desestimulado pelo risco de acarretar carências nutricionais.
 - C. Recomenda-se que após o sexto mês a alimentação seja complementada com novos alimentos e fórmula láctea.
 - D. Há indícios de que a presença do pai em casa pode aumentar a chance de manutenção do AM por dois anos ou mais.
 - E. É importante que a criança fique o tempo suficiente na mama para ter acesso ao leite posterior, por conter mais calorias e saciar a criança.
-

QUESTÃO 17.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Lactente com um mês de vida apresenta placas eritematodescamativas arredondadas, com crostas amareladas aderidas a uma base eritematosa em região retroauricular, pescoço, períneo e couro cabeludo. Bom estado geral, sem sinais de desconforto ou presença de febre. Qual o agente etiológico mais provável do caso?

- A. Malassezia.
- B. Autoimunidade.



- C. Staphylococcus aureus.
 - D. Streptococcus do grupo A.
 - E. Staphylococcus epidermidis.
-

QUESTÃO 18.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Recém nascido apresenta no terceiro dia de vida apresenta quadro de conjuntivite, com secreção purulenta espessa e abundante bilateralmente e com sinais de quemose de pálpebras. Baseado no agente etiológico mais provável, qual seria a melhor conduta para o caso?

- A. Colírio de tobramicina.
 - B. Azitromicina por via oral.
 - C. Antibioticoterapia sistêmica com penicilina ou ceftriaxona.
 - D. Associação de colírio de eritromicina com penicilina cristalina.
 - E. Irrigação ocular com solução de soro fisiológico a cada duas horas.
-

QUESTÃO 19.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

A ressuscitação cardiopulmonar (RCP) envolve um conjunto de medidas que visam evitar ou reverter uma parada cardiorrespiratória (PCR) por meio de suporte ventilatório e circulatório. Sobre esta situação, analise as afirmativas abaixo. I - O prognóstico da RCP nas crianças é melhor que nos adultos. II - As arritmias ventriculares ocorrem na maioria dos casos das vítimas pediátricas em PCR extra-hospitalar. III - As compressões torácicas devem ser realizadas com profundidade de 1/3 do tórax, numa frequência não superior a 100 por minuto.

- A. As afirmativas I e II estão corretas, a III está incorreta.
 - B. As afirmativas I e III estão corretas, a II está incorreta.
 - C. As afirmativas II e III estão corretas, a I está incorreta.
 - D. As afirmativas I, II e III estão corretas.
 - E. As afirmativas I, II e III estão incorretas.
-

QUESTÃO 20.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

A alergia alimentar é uma doença de aparente prevalência mundial, caracterizada por reação adversa imunológica reprodutível a determinado alimento. Sobre a alergia alimentar, assinale a alternativa correta.



- A. A alergia ao ovo e leite é para toda a vida.
 - B. É mais comum em países em desenvolvimento.
 - C. A dosagem de IgE específica no soro é o padrão ouro para o diagnóstico.
 - D. A introdução tardia dos alimentos alergênicos pode aumentar o risco de alergia.
 - E. A síndrome de enterocolite induzida por proteínas alimentares (FPIES) é uma forma grave de alergia alimentar mediada por IgE.
-

QUESTÃO 21.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Qual das imunodeficiências primárias que se manifesta com atraso na queda do coto umbilical?

- A. Defeito citolítico.
 - B. Defeito do complemento.
 - C. Defeito dos granulócitos.
 - D. Defeito predominante de células B.
 - E. Defeito predominante de células T.
-

QUESTÃO 22.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Escolar apresenta-se com abscesso localizado em área de músculo reto femoral caracterizado pelo ultrassom com piomiosite. Relata trauma fechado anterior no local há 5 dias. O agente bacteriano mais provável deste abscesso é

- A. polimicrobiano.
 - B. Pseudomonas sp.
 - C. Staphylococcus aureus.
 - D. Streptococcus pyogenes.
 - E. Staphylococcus epidermidis.
-

QUESTÃO 23.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

No tratamento do paciente pediátrico com lúpus eritematoso sistêmico qual medicamento é indicado para todos os pacientes?

- A. Azatioprina.
- B. Ciclofosfamida.
- C. Hidroxicloroquina.
- D. Micofenolato de mofetila.



E. Pulsoterapia com esteroides.

QUESTÃO 24.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Sobre a distrofia muscular de Duchene, analise as afirmativas abaixo. I - História positiva dos tios paternos para o quadro. II - Apresentam déficit intelectual. III - Tem alta incidência de miocardiopatia. Assinale a alternativa correta.

- A. As afirmativas I e II são verdadeiras. A afirmativa III é falsa.
 - B. As afirmativas I e III são verdadeiras. A afirmativa II é falsa.
 - C. As afirmativas II e III são verdadeiras. A afirmativa I é falsa.
 - D. As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
 - E. As afirmativas I, II e III são falsas.
-

QUESTÃO 25.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

As leucodistrofias são alterações genéticas da substância branca do encéfalo. A leucodistrofia de predomínio occipital, com herança ligada ao X é a

- A. doença de Krabbe.
 - B. doença de Canavan.
 - C. adrenoleucodistrofia.
 - D. doença de Alexander.
 - E. leucodistrofia metacromática.
-

QUESTÃO 26.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Assinale a alternativa correta sobre a meningite na infância.

- A. O tratamento antibiótico empírico no período neonatal é feito preferencialmente com ampicilina + gentamicina.
 - B. A bactéria com maior poder de lesão é o pneumococo em qualquer idade.
 - C. A meningite meningocócica deve receber antibiótico pelo menos por 10 dias.
 - D. O isolamento do paciente deve ser por 72 horas após o início do antibiótico.
 - E. A profilaxia para os contatos íntimos deve ser com rifampicina oral por 2 dias para o meningococo e 4 dias para o pneumococo.
-

**QUESTÃO 27.**

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Um cisto branquial é uma massa benigna e congênita que se forma na região lateral do pescoço devido a uma falha na reabsorção do aparelho branquial durante o desenvolvimento embrionário. Qual o arco branquial em que ocorre maior incidência de cistos?

- A. Primeiro.
 - B. Segundo.
 - C. Terceiro.
 - D. Quarto.
 - E. Quinto.
-

QUESTÃO 28.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Assinale a alternativa correta sobre a síndrome do choque tóxico.

- A. A hemocultura é positiva para o agente em mais de 90% dos casos.
 - B. A vancomicina é o antibiótico de escolha devido à gravidade do caso.
 - C. O principal agente relacionado a essa síndrome é o *Staphylococcus epidermidis*.
 - D. Ocorre um exantema maculo papular difuso, mas que não afeta as mucosas..
 - E. O choque tóxico é uma apresentação de choque hiperdinâmico, com rash, hipotensão, pulsos periféricos amplos e rápida perfusão periférica.
-

QUESTÃO 29.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Sobre a artrite séptica na infância analise as alternativas abaixo. I – 50% ocorre antes dos 2 anos de vida. II – Predomina no sexo feminino. III – O *Staphylococcus aureus* predomina em todas as faixas etárias. Assinale a alternativa correta

- A. As afirmativas I e II estão corretas, a III está incorreta.
 - B. As afirmativas I e III estão corretas, a II está incorreta.
 - C. As afirmativas II e III estão corretas, a I está incorreta.
 - D. As afirmativas I, II e III estão corretas.
 - E. As afirmativas I, II e III estão incorretas.
-

QUESTÃO 30.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

A queimadura elétrica por baixa voltagem tem incidência aumentada entre crianças pequenas, muitas vezes pelo contato com cabos elétricos ou tomadas. A corrente alternada



doméstica é causa comum de lesões mais graves, considerando sua frequência arritmogênica, que pode causar uma exposição prolongada ao ficar "grudado". Sobre a conduta diante do paciente vítima de choque elétrico, assinale a alternativa correta.

- A. O tipo mais grave de queimadura é por baixa voltagem.
 - B. O grau de lesão externa da pele deve ser usado para se determinar a extensão do dano interno.
 - C. É indicado fazer a ressuscitação pela fórmula de Parkland, já que se trata de uma vítima de queimadura.
 - D. Diante de pacientes com sintomas leves ou queimaduras cutâneas leves, não é necessário realizar exame de eletrocardiograma (ECG) nem monitoração cardíaca contínua.
 - E. A creatinofosfoquinase [CPK] superior a 400 U/L é um sinal de lesão tecidual profunda e está associada a um risco aumentado de necessidade de enxerto de pele ou amputação.
-

QUESTÃO 31.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Sobre a dor de crescimento, é correto afirmar que

- A. em geral, é bilateral e intermitente.
 - B. existe um predomínio no sexo masculino.
 - C. ocorre no período noturno, exclusivamente.
 - D. é muscular e está acompanhada de febre e calafrios.
 - E. acomete preferencialmente os membros superiores e melhora com calor local.
-

QUESTÃO 32.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Criança de 9 anos foi atendida na emergência por suspeita de osteomielite. Sua mãe negou alergias ou comorbidades e referiu que a criança vinha apresentando febre, dor no joelho e limitação da deambulação. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada.

- A. Solicitar a avaliação da ortopedia para definir se é necessário realizar coletas para exames laboratoriais.
- B. Iniciar imediatamente antibioticoterapia e, em seguida, realizar coletas para a hemocultura e provas de atividade inflamatória.
- C. Realizar imediatamente uma tomografia computadorizada (TC) de joelho e coxa para identificar a extensão da lesão e programar a abordagem cirúrgica.
- D. Um pré tratamento de curta duração (<24 horas) com antibioticoterapia para osteomielite por *Staphylococcus aureus* tem um alto impacto no rendimento da cultura de abscessos ou espécimes ósseos.
- E. Proceder a uma anamnese detalhada e um exame físico minucioso, incluindo a procura de lesões de "porta de entrada", com foco em sinais de inflamação e dor local, a fim de guiar a



solicitação de exames complementares.

QUESTÃO 33.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Escores clínicos vem sido utilizados para um diagnóstico mais assertivo das apendicites. Um exemplo é o escore PAS (pediatric appendicitis score), que usa elementos de história clínica, exame físico e exames laboratoriais na identificação de pacientes com alta probabilidade da doença. Qual dos elementos abaixo não faz parte deste escore?

- A. Febre.
 - B. Anorexia.
 - C. Neutrofilia.
 - D. Proteína C reativa.
 - E. Migração da dor para fossa ilíaca direita.
-

QUESTÃO 34.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Sobre a manutenção ou quebra da confidencialidade no atendimento ao adolescente, assinale a alternativa correta.

- A. O paciente sempre deve ser informado dos limites da confidencialidade.
 - B. Episódios de automutilação não precisam ser comunicados aos responsáveis.
 - C. O paciente deve ser informado de que, em qualquer circunstância, todas as informações da consulta serão mantidas em sigilo.
 - D. Na investigação de suspeita de crime o médico não estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo legal.
 - E. Diante da necessidade de quebra de confidencialidade, o profissional não deve contar ao paciente que fará isso, para que não haja quebra de confiança.
-

QUESTÃO 35.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Paciente de 3 anos de idade com hipertrigliceridemia inicia quadro de dor abdominal e apresenta lipase 690U/L na triagem inicial. Apesar do manejo de dieta e da hidratação/analgesia, segue com dor após uma semana. Assinale a alternativa correta com relação à conduta indicada para o caso descrito.

- A. Dieta zero, nutrição parenteral sem lipídeo e antibiótico de largo espectro.
- B. Sedação contínua, suporte ventilatório para reduzir pressão intra-abdominal e dieta zero.
- C. Triagem com exame de imagem, sendo indicada ultrassonografia (USG) com Doppler.



- D. Antibiótico de largo espectro, exploração cirúrgica diagnóstica e nutrição parenteral total.
 - E. Avaliação clínica e laboratorial com seguimento de exame de imagem mediante tomografia computadorizada (TC) com contraste.
-

QUESTÃO 36.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Analise as afirmativas abaixo e identifique os componentes imprescindíveis para uso adequado da ventilação mecânica não invasiva. I. Adequação e vedação da máscara/interface. II. Ajuste de pressões inspiratória e expiratória para otimizar a abertura alveolar e de vias aéreas. III. Tempo adequado de aclimação com parâmetros em aumento gradual até alvo de tratamento. IV. Sedação para adequada acoplagem. Quais estão corretas?

- A. Apenas I e II.
 - B. Apenas III e IV.
 - C. Apenas I, II e III.
 - D. Apenas I, II e IV.
 - E. Todas estão corretas.
-

QUESTÃO 37.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Lactente de três dias de vida chega ao serviço de emergência com cianose. Foi diagnosticado no período pré-natal com tetralogia de Fallot e nas primeiras 48 horas de vida era corado e permaneceu estável clinicamente. Nas últimas duas horas apresentou-se progressivamente mais arroxeado, dando entrada na emergência com saturação de oxigênio (SatO₂) de 67%. Ao exame não se auscultou sopro. Assinale a alternativa que apresenta a melhor providência a ser tomada a seguir.

- A. Realizar ecocardiograma para a confirmação do diagnóstico.
 - B. Estabelecer acesso venoso e iniciar prostaglandina intravenosa.
 - C. Realizar um teste de hiperoxia para averiguar componente pulmonar na causa da cianose.
 - D. Ofertar oxigênio a 100% e caso não apresente melhora proceder intubação e uso de drogas vasoativas.
 - E. Administrar morfina para favorecer o shunt esquerda-direita por meio da comunicação interventricular.
-

QUESTÃO 38.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

A hipertensão intracraniana idiopática causa elevação da pressão intracraniana, sem massas ou hidrocefalia; a composição do líquido cefalorraquidiano é normal. Sobre esta situação



analise as afirmativas abaixo. I – Pode apresentar cefaleia difusa e perda transi tória da visão. II – Predomina em pacientes magros do sexo masculino. III – O tratamento inicial deve ser com acetazolamida.

- A. As afirmativas I e II estão corretas, a III está incorreta.
 - B. As afirmativas I e III estão corretas, a II está incorreta.
 - C. As afirmativas II e III estão corretas, a I está incorreta.
 - D. As afirmativas I, II e III estão corretas.
 - E. As afirmativas I, II e III estão incorretas.
-

QUESTÃO 39.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Qual a primeira alteração observada nos casos de neuromielite óptica?

- A. Anisocoria.
 - B. Cegueira lacunar.
 - C. Dor ocular unilateral.
 - D. Edema de papila bilateral.
 - E. Alteração de visão de cores.
-

QUESTÃO 40.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

A encefalomielite disseminada aguda (ADEM) pode ocorrer em qualquer idade, com uma média de idade entre 5 e 8 anos, com discreto predomínio no sexo masculino. Qual seria a marca (característica principal) desta doença?

- A. Ataxia.
 - B. Perda visual.
 - C. Encefalopatia.
 - D. Crise convulsiva.
 - E. Neuropatias cranianas.
-

QUESTÃO 41.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Qual a terapia mais comumente empregada no tratamento dos casos de ADEM?

- A. Plasmaférese.
- B. Imunoglobulinas.
- C. Imunobiológicos.
- D. Anticonvulsivantes.



E. Pulsoterapia com metilprednisolona.

QUESTÃO 42.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

A dermatomiosite juvenil é a miosite inflamatória mais comum em crianças. Sobre esta doença, analise as afirmativas abaixo. I - A fraqueza muscular é predominantemente distal. II - As lesões cutâneas desenvolvem-se como primeiro sintoma em 50% dos pacientes. III - As pápulas de Gottron são consideradas lesões tradicionais da doença.

- A. As afirmativas I e II estão corretas, a III está incorreta.
 - B. As afirmativas I e III estão corretas, a II está incorreta.
 - C. As afirmativas II e III estão corretas, a I está incorreta.
 - D. As afirmativas I, II e III estão corretas.
 - E. As afirmativas I, II e III estão incorretas.
-

QUESTÃO 43.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

A doença do soro é uma vasculite causada por hipersensibilidade sistêmica e mediada por imunocomplexos, classicamente atribuída à administração terapêutica com proteínas de soro heterólogo ou outras medicações. Sobre esta situação, analise as afirmativas abaixo. I - A doença do soro é um clássico exemplo de uma reação de hipersensibilidade do tipo III causada por complexos antígenos-anticorpos. II - As manifestações clínicas costumam acontecer nas primeiras 48 horas. III - A urticária e as erupções cutâneas morbiliformes são os tipos predominantes de erupções cutâneas.

- A. As afirmativas I e II estão corretas, a III está incorreta.
 - B. As afirmativas I e III estão corretas, a II está incorreta.
 - C. As afirmativas II e III estão corretas, a I está incorreta.
 - D. As afirmativas I, II e III estão corretas.
 - E. As afirmativas I, II e III estão incorretas.
-

QUESTÃO 44.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Lactente de 2 anos asmático em uso de profilaxia inalatória apresenta-se com lacrimejamento importante (epífora), fotofobia e contração excessiva das pálpebras (blefaroespasma). Qual o diagnóstico mais provável?

- A. Glaucoma.
- B. Alta miopia.



- C. Ceratite viral.
 - D. Conjuntivite química.
 - E. Conjuntivite alérgica.
-

QUESTÃO 45.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Paciente com doença de Crohn apresenta-se com um processo cutâneo ulcerativo focal com bordas bem delimitadas, inflamadas e elevadas, e um centro purulento e úmido. Qual seria esta manifestação cutânea?

- A. Eritema nodoso.
 - B. Pioderma gangrenoso.
 - C. Tromboflebite inflamatória.
 - D. Necrólise epidérmica tóxica.
 - E. Dermatose neutrofílica aguda.
-

QUESTÃO 46.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Qual o principal diagnóstico diferencial a anemia ferropriva?

- A. Talassemia minor.
 - B. Talassemia major.
 - C. Deficiência de folato.
 - D. Leucemia linfocítica aguda.
 - E. Deficiência de vitamina B12.
-

QUESTÃO 47.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

A anemia megaloblástica é uma anemia macrocítica usualmente acompanhada de leucopenia e trombocitopenia. Qual achado no sangue periférico que é muito característico desta anemia?

- A. Plaquetas gigantes.
 - B. Reticulocitos elevados.
 - C. Neutrófilos hipersegmentados.
 - D. Volume corpuscular médio normal.
 - E. Alta contagem de glóbulos vermelhos.
-

**QUESTÃO 48.**

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

A dermatite atópica é uma dermatose inflamatória de curso crônico e recidivante, de etiologia desconhecida e início precoce. Os surtos inflamatórios da dermatite atópica, principalmente com formas leves e moderadas, são controlados pelo uso de

- A. antibióticos tópicos.
 - B. pimecrolimus tópico.
 - C. anti-histamínicos orais.
 - D. corticosteroides tópicos.
 - E. corticosteroides sistêmicos.
-

QUESTÃO 49.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Qual medicação a ser indicada em casos de dermatite atópica grave não controlada com medicamentos tópicos?

- A. Ciclosporina.
 - B. Ciclofosfamida.
 - C. Hidroxicloroquina.
 - D. Corticoides sistêmicos.
 - E. Antihistamínicos sistêmicos.
-

QUESTÃO 50.

AMP - PR-2026-Objetiva - PR | R+

Adolescente apresenta-se com febre prolongada (abaixo de 39°C), de início abrupto e com duração já de 10 dias, dor de garganta e adinamia. Ao exame com linfadenomegalia cervical em cadeias occipitais e supraclaviculares, esplenomegalia, hiperemia de orofaringe com algumas petéquias em palato. Hemograma com linfócitos atípicos em sangue periférico. Qual o diagnóstico mais provável?

- A. Rubéola.
- B. Faringite estreptocócica.
- C. Mononucleose infecciosa.
- D. Leucemia linfocítica aguda.
- E. Linfohistiocitose hemofagocítica.



GABARITO

1. (A) (B) (C) (D) (E)

2. (A) (B) (C) (D) (E)

3. (A) (B) (C) (D) (E)

4. (A) (B) (C) (D) (E)

5. (A) (B) (C) (D) (E)

6. (A) (B) (C) (D) (E)

7. (A) (B) (C) (D) (E)

8. (A) (B) (C) (D) (E)

9. (A) (B) (C) (D) (E)

10. (A) (B) (C) (D) (E)

11. (A) (B) (C) (D) (E)

12. (A) (B) (C) (D) (E)

13. (A) (B) (C) (D) (E)

14. (A) (B) (C) (D) (E)

15. (A) (B) (C) (D) (E)

16. (A) (B) (C) (D) (E)

17. (A) (B) (C) (D) (E)

18. (A) (B) (C) (D) (E)

19. (A) (B) (C) (D) (E)

20. (A) (B) (C) (D) (E)

21. (A) (B) (C) (D) (E)

22. (A) (B) (C) (D) (E)

23. (A) (B) (C) (D) (E)

24. (A) (B) (C) (D) (E)

25. (A) (B) (C) (D) (E)

26. (A) (B) (C) (D) (E)

27. (A) (B) (C) (D) (E)

28. (A) (B) (C) (D) (E)

29. (A) (B) (C) (D) (E)

30. (A) (B) (C) (D) (E)

31. (A) (B) (C) (D) (E)

32. (A) (B) (C) (D) (E)

33. (A) (B) (C) (D) (E)

34. (A) (B) (C) (D) (E)

35. (A) (B) (C) (D) (E)

36. (A) (B) (C) (D) (E)

37. (A) (B) (C) (D) (E)

38. (A) (B) (C) (D) (E)

39. (A) (B) (C) (D) (E)

40. (A) (B) (C) (D) (E)

41. (A) (B) (C) (D) (E)

42. (A) (B) (C) (D) (E)

43. (A) (B) (C) (D) (E)

44. (A) (B) (C) (D) (E)

45. (A) (B) (C) (D) (E)

46. (A) (B) (C) (D) (E)

47. (A) (B) (C) (D) (E)

48. (A) (B) (C) (D) (E)

49. (A) (B) (C) (D) (E)

50. (A) (B) (C) (D) (E)



RESPOSTAS

01.	E	21.	C	41.	E
02.	D	22.	C	42.	C
03.	A	23.	C	43.	B
04.	D	24.	C	44.	A
05.	B	25.	C	45.	B
06.	E	26.	B	46.	A
07.	C	27.	B	47.	C
08.	C	28.	E	48.	D
09.	D	29.	B	49.	A
10.	E	30.	E	50.	C
11.	A	31.	A		
12.	C	32.	E		
13.	C	33.	D		
14.	C	34.	A		
15.	D	35.	E		
16.	E	36.	C		
17.	A	37.	B		
18.	C	38.	B		
19.	E	39.	E		
20.	D	40.	C		