



medway

**AMRIGS - RS-2026-
Objetiva - RS**



NOME DO CANDIDATO:

ASSINATURA

SALA:

CARTEIRA:

INSTRUÇÕES

Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES contém 25 questões.

Escreva seu nome completo, sala, carteira e assine no campo indicado.

Utilize caneta de tinta **preta**.

Responda as questões de múltipla escolha no GABARITO.

Não será permitida qualquer espécie de consulta nem o uso de aparelhos eletrônicos.

Leia atentamente as instruções contidas no CADERNO DE RESPOSTAS.

Boa Prova!



QUESTÃO 1.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Recém-nascida (RN) a termo, nascida de parto vaginal sem intercorrências, apresenta, ao exame inicial, ainda na sala de parto, lesões vesicopustulosas em região perineal e no tórax, sem eritema ao redor. A mãe apresentou três episódios de infecção urinária tratadas no pré-natal, sendo a última 15 dias antes do parto. Sorologias maternas são negativas. Com 18 horas de vida, RN encontrava-se em bom estado geral, sugando bem ao seio materno e com duas vesicopústulas na região glútea e cervical. As outras haviam rompido, permanecendo descamação em colarete e mancha hipercômica cervical. A conduta indicada nesse caso é:

- A. Observação clínica e orientação de que se trata de eritema tóxico sem complicação.
 - B. Observação clínica, pois trata-se de melanose pustulosa transitória neonatal.
 - C. Avaliação com hemograma e PCR, e iniciar antibiótico pois o quadro é compatível com sepsis neonatal precoce.
 - D. Solicitar sorologia para herpes e iniciar aciclovir EV, considerando história de lesões ao nascimento neonatal precoce com aspecto de herpes congênita.
-

QUESTÃO 2.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Qual das alternativas abaixo NÃO contempla uma medida preconizada pelas diretrizes nacionais visando à prevenção da transmissão vertical em recém-nascido exposto ao HIV?

- A. Clampeamento precoce do cordão umbilical.
 - B. Contraindicação ao aleitamento materno.
 - C. Contraindicação do contato pele a pele entre mãe-bebê.
 - D. Banho ainda no centro obstétrico nas primeiras horas de vida.
-

QUESTÃO 3.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Para hemoculturas em RNs com cateter venoso central com suspeita de infecção primária da corrente sanguínea relacionada à assistência à saúde, a forma mais adequada de coleta é através da coleta de duas amostras de sangue:

- A. De duas veias periféricas distintas no mesmo momento.
 - B. De uma veia periférica, em momentos distintos.
 - C. Do cateter venoso central, em momentos distintos.
 - D. De uma veia periférica e do cateter venoso central, separadamente.
-

QUESTÃO 4.



Sobre o uso da cafeína como tratamento farmacológico para a apneia da prematuridade, assinale a alternativa correta.

- A. A maior parte dos RNs <28 semanas e/ou <1000g deve receber a medicação de forma profilática ainda no primeiro dia de vida.
 - B. RN entre 28 e 32 semanas deve receber a medicação apenas em caso de necessidade de suporte ventilatório invasivo ou se clínica de apneia.
 - C. Caso haja novo episódio de apneia após a suspensão da medicação, não está indicada dose de ataque.
 - D. A cafeína possui benefícios em prevenir intubação e DBP, mas não previne retinopatia da prematuridade ou enterocolite necrosante.
-

QUESTÃO 5.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

RN pré-termo de 26 semanas, 24h de vida, em insuficiência respiratória apesar de CPAP e FiO₂ 0,70. Gasometria: pH 7,20, PCO₂ 75, PO₂ 48. Decide-se por intubação orotraqueal. Qual é a conduta mais adequada em relação à analgesia e sedação?

- A. Intubar imediatamente, sem uso de medicamentos.
 - B. Administrar paracetamol.
 - C. Realizar analgesia com um opioide.
 - D. Utilizar benzodiazepínico para sedação.
-

QUESTÃO 6.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Lactente em insuficiência respiratória por pneumonia complicada, com saturação 85% na admissão. Entre os fatores relacionados ao conteúdo arterial de oxigênio, qual é o principal fator associado à hipoxemia?

- A. Anemia.
 - B. Saturação baixa.
 - C. Baixa pressão arterial de oxigênio.
 - D. Resistência vascular sistêmica aumentada.
-

QUESTÃO 7.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+



Criança 7 anos em coma por intoxicação aguda por tramadol. Pupilas mióticas e não reativas. O valor da escala de coma de Glasgow pode estar:

- A. Inalterado.
 - B. Em 6.
 - C. Em 10.
 - D. Em 14.
-

QUESTÃO 8.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Assinale a alternativa que apresenta a medicação para bloqueio neuromuscular necessária na sequência rápida de intubação em criança com hipertensão intracraniana e contraindicada em familiares com hipertermia maligna.

- A. Midazolam.
 - B. Succinilcolina.
 - C. Etomidato.
 - D. Rocurônio.
-

QUESTÃO 9.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

São terapêuticas do manejo da síndrome do desconforto respiratório agudo refratária por influenza: I. Óxido nítrico inalado se hipertensão pulmonar. II. ECMO venovenoso. III. Prona. Quais estão corretas?

- A. I e II
 - B. I e III
 - C. II e III
 - D. I, II e III
-

QUESTÃO 10.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Qual a melhor relação I:E para ventilar artificialmente um pré-escolar com asma quase fatal?

- A. 1:1
 - B. 1:2
 - C. 1:4
 - D. 2:1
-

**QUESTÃO 11.**

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Droga vasoativa inotrópica que aumenta consumo de oxigênio miocárdico:

- A. Milrinone
 - B. Adrenalina
 - C. Noradrenalina
 - D. Dobutamina
-

QUESTÃO 12.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Escolar, 8 anos, 40 kg, chega desmaiado. FC 300 bpm, QRS estreitos, perfusão ruim, sem acesso vascular. Opta-se por cardioversão elétrica. O choque inicial deve ser de:

- A. 20 J
 - B. 80 J
 - C. 100 J
 - D. 120 J
-

QUESTÃO 13.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Adolescente, 14 anos, 70 kg, em apneia por laringoespasmo + angioedema + urticária disseminada. Dose IM imediata de adrenalina pura:

- A. 0,1 mL
 - B. 0,5 mL
 - C. 0,7 mL
 - D. 1 mL
-

QUESTÃO 14.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Na abordagem da criança vítima de acidente automobilístico, qual dano deve ser o primeiro a ser tratado?

- A. Lesão traqueal
- B. Pneumotórax hipertensivo
- C. Fratura esplênica



D. Crise convulsiva tônico-clônica

QUESTÃO 15.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Na crise adrenal do lactente em choque séptico, com hiponatremia e hiperpotassemia, a causa mais plausível da parada cardiorrespiratória é:

- A. Desidratação neuronal da hiponatremia
 - B. Edema cerebral da hiperpotassemia
 - C. Fibrilação ventricular da hiperpotassemia
 - D. Hipoxemia pela curva de dissociação da hemoglobina
-

QUESTÃO 16.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Menina 14 anos, 16h/dia no celular, irritada, dependente, queda escolar, pânico ao retirar aparelho, ameaça cortar pulsos. Diagnóstico:

- A. Depressão
 - B. Nomofobia
 - C. Bipolaridade
 - D. Fobia social
-

QUESTÃO 17.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Escolar 6 anos, dermatite atópica clássica (pregas, pele seca, prurido, liquenificação), histórico de asma e rinite. Higiene com sabonetes de pH _____ tópico.

- A. neutro - antibiótico
 - B. neutro - corticoide
 - C. levemente ácido – antibiótico
 - D. levemente ácido – corticoide
-

QUESTÃO 18.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Menina 30 meses, EPF positivo para *Ascaris sp.* e *Entamoeba histolytica*. Tratamento que cobre ambos:



- A. Mebendazol
 - B. Albendazol
 - C. Nitazoxanida
 - D. Metronidazol
-

QUESTÃO 19.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Menino 12 anos, calendário completo até 4 anos. Quais vacinas devem ser dadas em clínica privada?

- A. HPV4, dT, Dengue, ACWY, Hep B
 - B. HPV4, dTpa, Influenza, Dengue, Hep A
 - C. HPV9, dTpa, Influenza, Dengue, ACWY e B
 - D. HPV9, dT, Varicela, Meningo B e C
-

QUESTÃO 20.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Menina 10 anos, polidipsia, poliúria, perda ponderal 2 kg. Glicemia capilar 230 mg/dL.

- A. Diagnóstico só com TOTG
 - B. Sintomas + glicemia confirmam DM
 - C. Autoanticorpos antes do tratamento
 - D. Diagnóstico só com jejum ≥ 126
-

QUESTÃO 21.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Menina 4 anos com lesão do nervo radial. Achado típico:

- A. Mão caída
 - B. Mão em garra
 - C. Incapacidade de oposição do polegar
 - D. Dupuytren
-

QUESTÃO 22.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Menina 8 anos, paresia dos nervos VI e VII à esquerda + Babinski à direita. Diagnóstico:



- A. Abscesso frontal
 - B. Paralisia de Bell
 - C. Trombose de seio cavernoso
 - D. Processo expansivo de tronco encefálico
-

QUESTÃO 23.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Menina 5 anos, cefaleia há 1 mês, hemianopsia bitemporal. Comprometimento de:

- A. Lobo occipital
 - B. Lobo temporal
 - C. Corpo geniculado
 - D. Quiasma óptico
-

QUESTÃO 24.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Menino 8 anos, TCE há 2 semanas, cirurgia prévia, preserva ciclo vigília-sono mas não interage. Acorda, mas sem consciência, respostas apenas reflexas. Diagnóstico:

- A. Coma
 - B. Estado minimamente consciente
 - C. Estado vegetativo
 - D. Síndrome do cativo
-

QUESTÃO 25.

AMRIGS - RS-2026-Objetiva - RS | R+

Convulsão febril simples — alternativa correta:

- A. Classificada como epilepsia focal
- B. <15 min, febril, previamente hígida, infecção leve
- C. Recorrência 30%, risco de epilepsia 1%
- D. Avaliação com neuropediatra + EEG + TC após 1 mês



GABARITO

1.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
2.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
3.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
4.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
5.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
6.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
7.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
8.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
9.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
10.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
11.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
12.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
13.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
14.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
15.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
16.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
17.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
18.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
19.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
20.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
21.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
22.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
23.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
24.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
25.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D



RESPOSTAS

01.	B
02.	C
03.	D
04.	A
05.	C
06.	A
07.	B
08.	B
09.	D
10.	C
11.	D
12.	A
13.	B
14.	A
15.	C
16.	ANULADA
17.	D
18.	C
19.	C
20.	B

21.	A
22.	D
23.	D
24.	C
25.	C