



medway

**AMRIGS - RS-2025-
Objetiva - RS**



NOME DO CANDIDATO:

ASSINATURA

SALA:

CARTEIRA:

INSTRUÇÕES

Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES contém 25 questões.

Escreva seu nome completo, sala, carteira e assine no campo indicado.

Utilize caneta de tinta **preta**.

Responda as questões de múltipla escolha no GABARITO.

Não será permitida qualquer espécie de consulta nem o uso de aparelhos eletrônicos.

Leia atentamente as instruções contidas no CADERNO DE RESPOSTAS.

Boa Prova!



QUESTÃO 1.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

Sobre a presença de massa anexial no útero, é correto afirmar que:

- A. Em uma mulher na menacme, um caso de cisto simples de 6 cm deve ser imediatamente encaminhado para um especialista (ginecologista).
 - B. Uma imagem sólida ovariana de 2 cm deve ser observada com uma nova ecografia transvaginal em 3 meses.
 - C. Em uma mulher na menacme, a presença de um cisto hemorrágico de 7 cm deve ser acompanhada com uma nova ecografia transvaginal em 3 meses.
 - D. A ecografia transvaginal é o exame de rotina para rastreamento de câncer de ovário.
-

QUESTÃO 2.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

Uma paciente assintomática de 27 anos, com prole completa, traz uma ecografia que demonstra uma lesão tubular, com septação incompleta, com conteúdo líquido, apresentando projeções curtas e arredondadas em torno da parede interna de uma estrutura tubular distendida por fluido, medindo 7 x 4,5 x 4 cm. O médico da unidade de saúde decidiu que a paciente deveria realizar uma tomografia, pediu marcadores tumorais (antígeno de câncer 125 e alfafetoproteína), pensando em câncer de ovário. A seguir, encaminhou-a para o centro oncológico. A hipótese diagnóstica e a conduta do médico estão:

- A. Corretas.
 - B. Parcialmente corretas. A hipótese diagnóstica está correta, mas deveriam ter sido adicionadas fosfatase alcalina e tomografia nos exames solicitados.
 - C. Parcialmente corretas. O médico deveria complementar os marcadores tumorais com antígeno carcinogênico, lactato desidrogenase e gonadotrofina coriônica humana.
 - D. Incorretas. O caso apresentado é de hidrossalpinge, que não necessita de acompanhamento com exames de imagem.
-

QUESTÃO 3.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

Qual dos casos abaixo indica a necessidade de uma ecografia transvaginal?

- A. Paciente na menopausa com sangramento uterino anormal.
 - B. Paciente na menacme com sangramento uterino anormal com útero abaixo da sínfise púbica.
 - C. Paciente na menopausa que tem um familiar com câncer de endométrio.
 - D. Rastreamento de câncer de endométrio.
-



QUESTÃO 4.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

Assinale a alternativa que apresenta a prescrição mais correta de um contraceptivo monofásico de 0,03 mg de etinilestradiol e de 0,15 mg de levonorgestrel, em uma cartela com 21 comprimidos:

- A. Tomar 1 comprimido via oral da primeira cartela no primeiro dia que parar a menstruação. Tomar por 21 dias, fazer uma pausa de 7 dias e reiniciar no 7º dia. Não há necessidade de usar outro método contraceptivo durante uma semana para segurança de anticoncepção.
 - B. Tomar o primeiro comprimido da primeira cartela no primeiro dia da menstruação. Tomar por 21 dias, fazer uma pausa de 7 dias e reiniciar no 8º dia, sem se preocupar com a menstruação.
 - C. Iniciar a cartela em qualquer dia do ciclo, tomando 1 comprimido via oral por 21 dias. Não é necessário usar outro método contraceptivo durante uma semana para segurança de anticoncepção.
 - D. Tomar o primeiro comprimido da primeira cartela no primeiro dia da menstruação. Tomar por 21 dias, fazer uma pausa de 7 dias. Esperar vir a menstruação, e reiniciar no 8º dia, quando não deve haver mais menstruação.
-

QUESTÃO 5.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

Assinale a alternativa que apresenta o fio cirúrgico que tem o maior tempo de absorção:

- A. Categute simples.
 - B. Categute cromado.
 - C. Poliglactina com estearato de cálcio (Vicryl®).
 - D. Polidioxanona (PDS®).
-

QUESTÃO 6.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

No início de uma histerectomia, o residente do segundo ano pede que você lhe alcance o Farabeuf. O instrumento solicitado é apresentado na alternativa:

- A.



B.



C.



D.



QUESTÃO 7.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

O procedimento apresentado na Figura 1 abaixo é uma:




Figura 1



- A. Culdocentese.
 - B. Curetagem uterina.
 - C. Coleta de oócitos para fertilização in vitro.
 - D. Histerossalpingografia.
-

QUESTÃO 8.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

O uso de ácido acetilsalicílico e de carbonato de cálcio é recomendado para a prevenção de pré-eclampsia em pacientes com risco elevado nos seguintes casos, EXCETO:

- A. Diabetes.
 - B. Hipertensão arterial crônica.
 - C. Tabagismo.
 - D. Trombofilia.
-

QUESTÃO 9.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

No puerpério fisiológico: I - A involução uterina ocorre por retração e contração uterinas, o que conduz à má-nutrição, hipoxia celular e reflexo uteromamário nas que amamentam. II - Em mulheres que não amamentam, a função do eixo hipófise-hipotálamo geralmente se normaliza entre 4 e 6 semanas. III - O ato de amamentar não estimula o crescimento adequado da boca e mandíbula do recém-nascido, mantendo uma adequação anatômica do aparelho estomatognático. Quais estão corretas?

- A. Apenas I.
 - B. Apenas II.
 - C. Apenas I e II.
 - D. Apenas II e III.
-

QUESTÃO 10.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

Assinale a alternativa INCORRETA sobre a sífilis:

- A. A sorologia só é positiva de 30 a 40 dias após o contágio.
- B. O cancro mole aparece em geral de 21 a 30 dias após o contágio.
- C. Roséolas são lesões exantemáticas, maculares e papulosas, na pele e/ou mucosas genitais ou bucais.



D. O tratamento de gestante com sífilis é realizado somente com penicilina.

QUESTÃO 11.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

A conduta ativa no terceiro período do parto é a maneira efetiva de prevenir a hemorragia pós-parto e propõe: I - Uso de agente uterotônico durante a expulsão do ombro anterior. II - Tração controlada do cordão umbilical e massagem uterina. III - Ligadura precoce do cordão umbilical. Quais estão corretas?

- A. Apenas I.
 - B. Apenas II.
 - C. Apenas I e II.
 - D. I, II e III.
-

QUESTÃO 12.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

Paciente de 26 semanas de gravidez vem à consulta de pré-natal no posto de saúde com queixa de corrimento vaginal. O médico do posto não tem microscópio disponível, somente uma fita de pH e uma solução de hidróxido de potássio. O pH vaginal foi menor do que 4 e o teste com KOH foi negativo. Considerando o caso apresentado, o diagnóstico mais provável e a conduta são, respectivamente:

- A. Vaginose bacteriana – metronidazol por via oral.
 - B. Candidíase – clotrimazol.
 - C. Corrimento fisiológico da gravidez – tranquilizar a paciente.
 - D. Tricomoníase – secnidazol.
-

QUESTÃO 13.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

Paciente de 36 semanas de gravidez vem à consulta de pré-natal no posto de saúde com queixa de ter eliminado “minhoquinhas brancas” nas fezes, que se mexiam. O diagnóstico mais provável e a conduta para o caso são, respectivamente:

- A. Giardíase – metronidazol.
 - B. Teníase – praziquantel.
 - C. Ascaridíase – albendazol.
 - D. Balantidíase – metronidazol.
-



QUESTÃO 14.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

Analise a cardiotocografia apresentada na Figura 2 abaixo: Segundo o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia (2010), qual é a categoria da cardiotocografia apresentada?




Figura 2

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.

QUESTÃO 15.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

Paciente de 27 semanas de gravidez vem à consulta com queixas de febre de 39°C há 4 dias. No dia da consulta, apresentava manchas na pele, dores musculares fortes (+++/+++), cefaleia e prurido leve. Ao exame físico, não apresentava dor significativa nas articulações, alguns linfonodos palpáveis e o exame neurológico era normal. O diagnóstico mais provável nesse caso é:

- A. Herpes-zóster.
- B. Zika vírus.
- C. Chikungunya.
- D. Dengue.

QUESTÃO 16.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

Em relação à toxoplasmose, analise as assertivas a seguir: I - O risco de transmissão para o feto aumenta com a duração da gravidez. II - A tríade clássica coriorretinite, hidrocefalia e calcificações intracerebrais (síndrome toxoplasmósica) ocorre em 90% dos casos em recém-



nascidos. III - O teste de avidéz IgG com alta avidéz indica infecção recente quando realizado no primeiro trimestre da gestação. Quais estão corretas?

- A. Apenas I.
 - B. Apenas II.
 - C. Apenas I e II.
 - D. I, II e III.
-

QUESTÃO 17.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

Em uma mulher com saúde normal na menacme, é correto afirmar que a ovulação ocorre:

- A. Cerca de 48 horas após o pico de estradiol.
 - B. 32 horas após o aumento inicial do hormônio luteinizante.
 - C. 48 horas após o pico do hormônio luteinizante.
 - D. 12 horas após o pico de progesterona.
-

QUESTÃO 18.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

São enzimas que impedem que o ovário seja incapaz de produzir mineralocorticoides ou glicocorticoides: I - 21-hidroxilase. II - 11- β -hidroxilase. III - 18-hidroxilase redutase. Quais estão corretas?

- A. Apenas I.
 - B. Apenas II.
 - C. Apenas I e II.
 - D. I, II e III.
-

QUESTÃO 19.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

Paciente em período expulsivo, com analgesia peridural, apresentação cefálica fetal em plano +3 de De Lee e em variedade de posição Occípito-Iliaca Direita Anterior (OIDA) apresenta bradicardia fetal de 60 bpm. Considerando o caso apresentado, a melhor conduta é:

- A. Proceder à reanimação fetal intrauterina com terbutalina.
 - B. Proceder à manobra de Kristeller.
 - C. Fazer o término do parto com vácuo extrator.
 - D. Fazer o término do parto com locação de fórceps.
-

**QUESTÃO 20.**

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

Em relação à Diabetes Mellito Gestacional (DMG), analise as assertivas a seguir: I - A partir da viabilidade fetal, a vitalidade fetal e ultrassonografia obstétrica serão mensais. II - No puerpério, não se deve suspender a prescrição de insulina e dieta para diabético. III - Mulheres que apresentaram DMG deverão ser reavaliadas e reclassificadas 6 meses após o parto, utilizando-se os critérios padronizados para a população não gestante. Quais estão corretas?

- A. Apenas I.
 - B. Apenas II.
 - C. Apenas I e II.
 - D. I, II e III.
-

QUESTÃO 21.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

São medidas de reanimação fetal intrauterina durante o parto direcionadas a resolver o problema fisiopatológico do sofrimento fetal agudo: I - Aumentar a oxigenação materna e fazer mudança de decúbito. II - Fazer hidratação materna em bolus. III - Retirar o agente indutor e fazer uso de terbutalina se necessário. Quais estão corretas?

- A. Apenas I.
 - B. Apenas II.
 - C. Apenas I e II.
 - D. I, II e III.
-

QUESTÃO 22.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

O ponto de flexão fetal para a utilização do vácuo extrator é:

- A. Na sutura sagital, cerca de 3 cm da fontanela bregma.
 - B. Na sutura sagital, cerca de 3 cm da fontanela lambda.
 - C. Em qualquer lugar da sutura parietal.
 - D. Junto às fontanelas, dependendo do grau de deflexão.
-

QUESTÃO 23.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

O tratamento das incoordenações e da inversão do gradiente da contratilidade uterina é feito por meio dos seguintes procedimentos: I - Colocação da paciente em decúbito lateral e/ou



administração de analgésicos e sedativos. II - Perfusão contínua de ocitocina em doses fisiológicas (1 a 8 mU/min). III - Amniorrexe. Quais estão corretos?

- A. Apenas I.
 - B. Apenas II.
 - C. Apenas I e II.
 - D. I, II e III.
-

QUESTÃO 24.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

O Ministério da Saúde, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina e o Centro Brasileiro de Classificação de Doenças, orientou que a Declaração de Óbito (DO) deve ser emitida para os seguintes casos de óbito fetal: I - Gestação que teve duração igual ou superior a 20 semanas. II - Feto com peso igual ou superior a 500 g. III - Estatura fetal igual ou superior a 25 cm. Quais estão corretos?

- A. Apenas I.
 - B. Apenas I e II.
 - C. Apenas I e III.
 - D. I, II e III.
-

QUESTÃO 25.

AMRIGS - RS-2025-Objetiva - RS | R+

Qual malformação uterina está menos relacionada com a interrupção da gestação?

- A. Arqueado.
- B. Didelfos.
- C. Unicornuado.
- D. Bicornuado.



GABARITO

1.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
2.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
3.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
4.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
5.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
6.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
7.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
8.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
9.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
10.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
11.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
12.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
13.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
14.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
15.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
16.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
17.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
18.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
19.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
20.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
21.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
22.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
23.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
24.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
25.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D



RESPOSTAS

01.	C
02.	D
03.	A
04.	B
05.	D
06.	A
07.	A
08.	C
09.	C
10.	B
11.	C
12.	B
13.	C
14.	A
15.	D
16.	A
17.	B
18.	D
19.	D
20.	A

21.	D
22.	B
23.	D
24.	D
25.	A